

فیزیک ۱

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

محمد رضا مظفری

گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه قم

مهر ۱۴۰۰

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

حروف یونانی پر کاربرد

alpha	α	آلفا
beta	β	بتا
gamma	γ	گاما
delta	δ	دلتا
theta	θ	تتا
eta	η	اتا
zeta	ζ	زتا

kappa	κ	کاپا
nu	ν	نوو
mu	μ	میو
psi	ψ	سای
phi	ϕ	فی
chi	χ	خی
sigma	σ	سیگما

omega	ω	اُمگا
lambda	λ	لامبدا
xi	ξ	کسی
rho	ρ	ر
tau	τ	تاو
epsilon	ϵ	اپسیلون
pi	π	پی

Delta	Δ	دلتا
Omega	Ω	اُمگا
Theta	Θ	تتا
Phi	Φ	فی
Psi	Ψ	سای
Sigma	Σ	سیگما

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

ثوابت خاص

$$\pi = 3.14159265359 \dots$$

$$\sqrt{2} = 1.41421356237 \dots$$

$$\sqrt{3} = 1.73205080757 \dots$$

اتحادهای ریاضی

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$$

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

فاکتوریل (Factorial)

$$n! = 1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times (n-1) \times n, \quad \forall n \in \mathbb{Z}^+$$

حالت خاص

$$0! = 1! = 1$$

ضرایب دوتایی (Binomial Coefficients)

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \binom{n}{n-k}$$

اتحاد دوتایی

$$(a+b)^n = \binom{n}{0}a^n + \binom{n}{1}a^{n-1}b + \binom{n}{2}a^{n-2}b^2 + \cdots + \binom{n}{n-1}a^2b^{n-1} + \binom{n}{n}b^n$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

ریشه‌های معادله درجه دوم

$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

اگر $\Delta > 0$


$$x_{\pm} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

اگر $\Delta = 0$

$$x_{\pm} = -\frac{b}{2a}$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

معادله خط




$$y - y_0 = m(x - x_0) \quad \text{یا} \quad \frac{y - y_0}{y_1 - y_0} = \frac{x - x_0}{x_1 - x_0}$$

$$\text{شیب خط} : m = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} = \tan \alpha$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

معادله خط




$$y - y_0 = m'(x - x_0), \quad \alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$$


$$\text{شیب خط عمودی: } m' = -\frac{1}{m} \text{ یا } \tan \beta = -\frac{1}{\tan \alpha} \text{ یا } \tan \alpha \tan \beta = -1$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

تعریف قدرمطلق




$$|x| = \begin{cases} x & x \geq 0 \\ -x & x < 0 \end{cases}$$



$$|x - x_0| = \begin{cases} x - x_0 & x \geq x_0 \\ -(x - x_0) & x < x_0 \end{cases}$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

تعریف قدرمطلق



$$|x + x_0| = \begin{cases} x + x_0 & x \geq -x_0 \\ -(x + x_0) & x < -x_0 \end{cases}$$

توان‌های کسری

$$\sqrt{x} = \sqrt[2]{x} = x^{\frac{1}{2}}, \quad x \geq 0$$

$$\sqrt[3]{x} = x^{\frac{1}{3}}$$


$$\sqrt{x^2} = |x|$$

$$\sqrt[3]{x^2} = x^{\frac{2}{3}}$$

$$\sqrt{x^3} = x^{\frac{3}{2}} = x\sqrt{x}, \quad x \geq 0$$


مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

معادله منحنی




مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

معادله منحنی




مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

معادله منحنی




مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

معادله منحنی




مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

معادله منحنی




مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

معادله منحنی




مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

معادله منحنی




مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

معادله منحنی




مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

معادله منحنی



مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

معادله منحنی



$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(y_0 + \frac{1}{x - x_0} \right) = y_0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(y_0 - \frac{1}{x - x_0} \right) = y_0$$



$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} \left(y_0 + \frac{1}{x - x_0} \right) \rightarrow +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} \left(y_0 - \frac{1}{x - x_0} \right) \rightarrow -\infty$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

برهم‌نهی منحنی‌ها

$$f(x) = \frac{1}{x} + x$$





مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

برهم‌نهی منحنی‌ها

$$f(x) = \frac{1}{x^{12}} - \frac{1}{x^6}$$

پتانسیل لnard-جونز :



مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

ماتریس‌ها

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

ماتریس A شامل m سطر و n ستون است.
اگر $m = n$ باشد ماتریس A رایک ماتریس مربعی می‌نامند.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mm} \end{bmatrix}$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

ماتریس‌ها

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

اگر $m = 1$ باشد ماتریس A را یک بردار سطری می‌نامند.

$$A = [a_{11} \quad a_{12} \quad \cdots \quad a_{1n}]$$

اگر $n = 1$ باشد ماتریس A را یک بردار ستونی می‌نامند.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix}$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

ماتریس‌ها

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \cdots & b_{mn} \end{bmatrix}$$

اگر تعداد سطرها و ستون‌های دو ماتریس با هم برابر باشند، می‌توان دو ماتریس را با هم جمع، تفریق و مقایسه کرد.
جمع،

$$c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}, \quad i = 1, \dots, m, \quad j = 1, \dots, n$$

$$C = A + B = \begin{bmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \cdots & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \cdots & a_{2n} + b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & a_{m2} + b_{m2} & \cdots & a_{mn} + b_{mn} \end{bmatrix} = B + A$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

ماتریس‌ها

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \cdots & b_{mn} \end{bmatrix}$$

اگر تعداد سطرها و ستون‌های دو ماتریس با هم برابر باشند، می‌توان دو ماتریس را با هم جمع، تفریق و مقایسه کرد.

تفریق،

$$c_{ij} = a_{ij} - b_{ij}, \quad i = 1, \dots, m, \quad j = 1, \dots, n$$

$$C = A - B = \begin{bmatrix} a_{11} - b_{11} & a_{12} - b_{12} & \cdots & a_{1n} - b_{1n} \\ a_{21} - b_{21} & a_{22} - b_{22} & \cdots & a_{2n} - b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} - b_{m1} & a_{m2} - b_{m2} & \cdots & a_{mn} - b_{mn} \end{bmatrix}$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

ماتریس‌ها

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1l} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2l} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{ml} \end{bmatrix},$$

$$B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{l1} & b_{l2} & \cdots & b_{ln} \end{bmatrix}$$

در ضرب ماتریسی $C = AB$ ، تعداد ستون‌های ماتریس A با تعداد سطرهای ماتریس B باید یکسان باشد. یعنی

$$[C]_{m \times n} = [A]_{m \times l} [B]_{l \times n}.$$

ضرب دو ماتریس خاصیت جابجایی ندارد،

$$AB \neq BA$$

نمایش اندیسی ضرب دو ماتریس

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^l a_{ik} b_{kj}, \quad i = 1, \dots, m, \quad j = 1, \dots, n$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

ماتریس‌ها

$$\begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{mn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1l} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2l} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{ml} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{l1} & b_{l2} & \cdots & b_{ln} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \vdots \\ \vdots \\ \cdots & \cdots & c_{ij} & \cdots & \cdots \\ \vdots \\ \vdots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \vdots \\ \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ik} & \cdots & a_{il} \\ \vdots \\ \vdots \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vdots \\ \vdots \\ \cdots & \cdots & b_{kj} & \cdots \\ \vdots \\ b_{lj} \end{bmatrix}$$

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + \cdots + a_{ik}b_{kj} + \cdots + a_{il}b_{lj}$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

ماتریس‌ها
ماتریس واحد

$$\mathbf{I} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}, \quad A\mathbf{I} = \mathbf{I}A = A, \quad \mathbf{I}_{ij} = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

ماتریس متقارن

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mm} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1m} & a_{2m} & \cdots & a_{mm} \end{bmatrix}$$

$$a_{ij} = a_{ji}$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

ماتریس 2×2

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

دترمینان ماتریس 2×2

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = \begin{array}{|c|c|} \hline a_{11} & a_{12} \\ \hline a_{21} & a_{22} \\ \hline \end{array} - \begin{array}{|c|c|} \hline a_{11} & a_{12} \\ \hline a_{21} & a_{22} \\ \hline \end{array}$$

$$|A| = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

واران ماتریس 2×2

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \begin{bmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{bmatrix}, \quad |A| \neq 0$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

حل دستگاه معادلات خطی به روش کرامر (Cramer)

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases}$$

نمایش ماتریسی

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$$

جوابهای دستگاه معادلات

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad x_2 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad |A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \neq 0$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

حل دستگاه معادلات خطی به روش کرامر (Cramer)

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases}$$

نمایش ماتریسی

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$$

جوابهای دستگاه معادلات

$$A \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} \xrightarrow{A^{-1}} A^{-1}A \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = A^{-1} \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}, \quad \boxed{A^{-1}A = AA^{-1} = \mathbf{I}}$$

$$\boxed{\mathbf{I} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}}, \quad \mathbf{I} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = A^{-1} \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = A^{-1} \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

ماتریس 3×3

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

دترمینان ماتریس 3×3

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

دترمینان ماتریس 3×3

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$|A| = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}$$

$$\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{21}a_{33} - a_{23}a_{31}$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

دترمینان ماتریس 3×3

$$|A| = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}$$

$$\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{21}a_{33} - a_{23}a_{31}$$

$$\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} = a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31}$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

دترمینان ماتریس 3×3

$$|A| = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}$$

$$\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{21}a_{33} - a_{23}a_{31}$$

$$\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} = a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31}$$

$$|A| = a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) - a_{12}(a_{21}a_{33} - a_{23}a_{31}) + a_{13}(a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31})$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

واران ماتریس 3×3

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

a_{11}	a_{12}	a_{13}
a_{21}	a_{22}	a_{23}
a_{31}	a_{32}	a_{33}

a_{11}	a_{12}	a_{13}
a_{21}	a_{22}	a_{23}
a_{31}	a_{32}	a_{33}

a_{11}	a_{12}	a_{13}
a_{21}	a_{22}	a_{23}
a_{31}	a_{32}	a_{33}

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \begin{bmatrix} \left| \begin{array}{cc|cc} a_{22} & a_{23} & & \\ a_{32} & a_{33} & & \end{array} \right| & - & \left| \begin{array}{cc|cc} a_{12} & a_{13} & & \\ a_{32} & a_{33} & & \end{array} \right| & \left| \begin{array}{cc|cc} a_{12} & a_{13} & & \\ a_{22} & a_{23} & & \end{array} \right| \\ \square & & \square & \square \\ \square & & \square & \square \end{bmatrix}$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

واران ماتریس 3×3

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

$$- \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{13} & a_{12} \\ a_{33} & a_{32} \end{vmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \begin{bmatrix} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} a_{13} & a_{12} \\ a_{33} & a_{32} \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix} \\ \square & \square & \square \\ \square & \square & \square \end{bmatrix}$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

واران ماتریس 3×3

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

a_{11}	a_{12}	a_{13}
a_{21}	a_{22}	a_{23}
a_{31}	a_{32}	a_{33}

a_{11}	a_{12}	a_{13}
a_{21}	a_{22}	a_{23}
a_{31}	a_{32}	a_{33}

a_{11}	a_{12}	a_{13}
a_{21}	a_{22}	a_{23}
a_{31}	a_{32}	a_{33}

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \begin{bmatrix} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} a_{13} & a_{12} \\ a_{33} & a_{32} \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix} \\ - \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{vmatrix} \\ \square & \square & \square \end{bmatrix}$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

واران ماتریس 3×3

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

$$-\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{23} & a_{21} \\ a_{33} & a_{31} \end{vmatrix}, \quad -\begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{13} & a_{11} \\ a_{23} & a_{21} \end{vmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \begin{bmatrix} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} a_{13} & a_{12} \\ a_{33} & a_{32} \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} a_{23} & a_{21} \\ a_{33} & a_{31} \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} a_{13} & a_{11} \\ a_{23} & a_{21} \end{vmatrix} \\ \square & \square & \square \end{bmatrix}$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

واران ماتریس 3×3

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

a_{11}	a_{12}	a_{13}
a_{21}	a_{22}	a_{23}
a_{31}	a_{32}	a_{33}

a_{11}	a_{12}	a_{13}
a_{21}	a_{22}	a_{23}
a_{31}	a_{32}	a_{33}

a_{11}	a_{12}	a_{13}
a_{21}	a_{22}	a_{23}
a_{31}	a_{32}	a_{33}

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \begin{bmatrix} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} a_{13} & a_{12} \\ a_{33} & a_{32} \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} a_{23} & a_{21} \\ a_{33} & a_{31} \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} a_{13} & a_{11} \\ a_{23} & a_{21} \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \end{bmatrix}, \quad |A| \neq 0$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

واران ماتریس 3×3

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

$$- \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{12} & a_{11} \\ a_{32} & a_{31} \end{vmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \begin{bmatrix} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} a_{13} & a_{12} \\ a_{33} & a_{32} \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} a_{23} & a_{21} \\ a_{33} & a_{31} \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} a_{13} & a_{11} \\ a_{23} & a_{21} \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} a_{12} & a_{11} \\ a_{32} & a_{31} \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \end{bmatrix}, \quad |A| \neq 0$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

حل دستگاه معادلات خطی به روش کرامر (Cramer)

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$$

جوابهای دستگاه معادلات

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}},$$


$$x_2 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{12} & b_2 & a_{23} \\ a_{13} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}},$$

$$x_3 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{12} & a_{22} & b_2 \\ a_{13} & a_{23} & b_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}$$

$$|A| \neq 0$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

اشکال هندسی
مثلث



قانون سینوسها

$$\frac{\sin \alpha}{a} = \frac{\sin \beta}{b} = \frac{\sin \gamma}{c}$$

$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$$

قانون کسینوسها


$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma$$

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha$$

$$b^2 = c^2 + a^2 - 2ca \cos \beta$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

اشکال هندسی
مثلث



$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$$

$$h = b \sin \alpha = a \sin \beta$$

$$\text{مساحت} = S = \frac{1}{2}hc$$


$$S = \frac{1}{2}bc \sin \alpha = \frac{1}{2}ac \sin \beta$$

مثلث متساوی الساقین

$$a = b, \quad \alpha = \beta$$


$$2\alpha + \gamma = 180^\circ$$

$$h = a \sin \alpha, \quad S = \frac{1}{2}ac \sin \alpha$$



مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

اشکال هندسی
مثلث



$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$$

$$h = b \sin \alpha = a \sin \beta$$


$$S = \frac{1}{2}hc = \frac{1}{2}bc \sin \alpha = \frac{1}{2}ac \sin \beta$$

مثلث متساوی الاضلاع

$$a = b = c, \quad \alpha = \beta = \gamma$$


$$3\alpha = 180^\circ \Rightarrow \alpha = 30^\circ$$

$$h = \frac{\sqrt{3}}{2}a, \quad S = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2$$



مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

اشکال هندسی
مثلث



$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$$

$$h = b \sin \alpha = a \sin \beta$$


$$S = \frac{1}{2}hc = \frac{1}{2}bc \sin \alpha = \frac{1}{2}ac \sin \beta$$

مثلث قائم الزاویه

$$\alpha = 90^\circ, \quad \beta + \gamma = 90^\circ$$


فیثاقورس : $a^2 = b^2 + c^2$

$$S = \frac{1}{2}ab$$



مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

اشکال هندسی
متوازی الاضلاع



$$\alpha + \beta = 180^\circ$$

$$AB \parallel DC, \quad AD \parallel BC, \quad h = b \sin \alpha$$


$$S = ha = ba \sin \alpha$$

ذوزنقه

$$\alpha + \eta = \beta + \gamma = 180^\circ$$


$$AB \parallel DC, \quad h = c \sin \alpha = d \sin \beta$$

$$S = \frac{1}{2}(a + b)h$$



مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

اشکال هندسی
دایره




$$\text{محیط} = P = 2\pi R$$

$$S = \pi R^2$$

$$x^2 + y^2 = R^2$$


$$\begin{cases} x = R \cos \theta \\ y = R \sin \theta \end{cases}$$

$$0 \leq \theta \leq 2\pi$$



مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

اشکال هندسی
دایره




$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$$


$$\begin{cases} x = x_0 + R \cos \theta \\ y = y_0 + R \sin \theta \end{cases}, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

اشکال هندسی
بیضی



$$S = \pi ab$$




$$a^2 = b^2 + c^2$$

$$\text{خروج از مرکز : } e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}}$$

$$|pF'| + |pF| = 2a$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

اشکال هندسی
بیضی




$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

$$\begin{cases} x = a \cos \theta \\ y = b \sin \theta \end{cases}, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

اشکال هندسی
بیضی




$$\frac{(x - x_0)^2}{a^2} + \frac{(y - y_0)^2}{b^2} = 1$$

$$\begin{cases} x = x_0 + a \cos \theta \\ y = y_0 + b \sin \theta \end{cases}, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

اشکال هندسی
کُره




$$S = 4\pi R^2$$

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک


اشکال هندسی
کُرّه



نقطه‌ی p : (x, y, z)


$$x^2 + y^2 + z^2 = R^2$$

$$\begin{cases} x = R \sin \theta \cos \phi \\ y = R \sin \theta \sin \phi \\ z = R \cos \theta \end{cases}, \begin{cases} 0 \leq \theta \leq \pi \\ 0 \leq \phi \leq 2\pi \end{cases}$$



مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

اشکال هندسی
کُره



نقطه‌ی O' مرکز کُره : (x_0, y_0, z_0)

نقطه‌ی p : $(x - x_0, y - y_0, z - z_0)$


$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = R^2$$

$$\begin{cases} x = x_0 + R \sin \theta \cos \phi \\ y = y_0 + R \sin \theta \sin \phi \\ z = z_0 + R \cos \theta \end{cases}$$

$$\begin{cases} 0 \leq \theta \leq \pi \\ 0 \leq \phi \leq 2\pi \end{cases}$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک


اشکال هندسی
استوانه



$$V = \pi R^2 H, \quad \begin{cases} S_{\text{جانبی}} = 2\pi R H \\ S_{\text{مقطع بالا}} = \pi R^2 \\ S_{\text{مقطع پایین}} = \pi R^2 \end{cases} \Rightarrow S_{\text{کل}} = 2\pi R(H + R)$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک


اشکال هندسی
استوانه



$$p \text{ نقطه‌ی } (x, y, z), \quad \begin{cases} x = R \cos \phi \\ y = R \sin \phi \\ z \end{cases}, \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi, \quad 0 \leq z \leq H$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

اشکال هندسی
مخروط




$$V = \frac{1}{3}\pi R^2 H$$

$$\begin{cases} S_{\text{جانبی}} = \pi Rl = \pi R\sqrt{R^2 + H^2} \\ S_{\text{مقطع بالایی}} = \pi R^2 \end{cases} \Rightarrow S_{\text{کل}} = \pi R^2 \left[1 + \sqrt{1 + \left(\frac{H}{R}\right)^2} \right]$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

اتحادهای مثلثاتی



در یک مثلث قائم الزاویه

$$\alpha + \beta = \frac{\pi}{2}, \quad a^2 + b^2 = c^2$$


تبدیل درجه D به رادیان R و بالعکس

$$R = \frac{\pi D}{180}, \quad D = \frac{180R}{\pi}$$

نکته: در اتحادهای مثلثاتی زوایا همیشه برحسب رادیان هستند.

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

اتحادهای مثلثاتی



در یک مثلث قائم الزاویه ($\alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$, $a^2 + b^2 = c^2$)

$$\sin \alpha = \frac{\text{ضلع مقابل}}{\text{وتر}} = \frac{a}{c},$$


$$\sin \beta = \frac{\text{ضلع مقابل}}{\text{وتر}} = \frac{b}{c}$$

$$\cos \alpha = \frac{\text{ضلع مجاور}}{\text{وتر}} = \frac{b}{c},$$

$$\cos \beta = \frac{\text{ضلع مجاور}}{\text{وتر}} = \frac{a}{c}$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

اتحادهای مثلثاتی



در یک مثلث قائم الزاویه ($\alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$, $a^2 + b^2 = c^2$)

$$\tan \alpha = \frac{\text{ضلع مقابل}}{\text{ضلع مجاور}} = \frac{a}{b},$$


$$\tan \beta = \frac{\text{ضلع مقابل}}{\text{ضلع مجاور}} = \frac{b}{a}$$

$$\cot \alpha = \frac{\text{ضلع مجاور}}{\text{ضلع مقابل}} = \frac{b}{a},$$

$$\cot \beta = \frac{\text{ضلع مجاور}}{\text{ضلع مقابل}} = \frac{a}{b}$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

اتحادهای مثلثاتی



در یک مثلث قائم الزاویه ($\alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$, $a^2 + b^2 = c^2$)

$\sin \alpha = \frac{a}{c}$	$\cos \alpha = \frac{b}{c}$
$\tan \alpha = \frac{a}{b}$	$\cot \alpha = \frac{b}{a}$

$\sin \beta = \frac{b}{c}$	$\cos \beta = \frac{a}{c}$
$\tan \beta = \frac{b}{a}$	$\cot \beta = \frac{a}{b}$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

اتحادهای مثلثاتی در یک مثلث قائم الزویه ($\alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$, $a^2 + b^2 = c^2$)

$$\begin{aligned} \sin \alpha &= \frac{a}{c}, & \cos \alpha &= \frac{b}{c} \\ \tan \alpha &= \frac{a}{b}, & \cot \alpha &= \frac{b}{a} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sin \beta &= \frac{b}{c}, & \cos \beta &= \frac{a}{c} \\ \tan \beta &= \frac{b}{a}, & \cot \beta &= \frac{a}{b} \end{aligned}$$

$$\sin \alpha = \cos \beta \Rightarrow \begin{cases} \sin \alpha = \cos(\frac{\pi}{2} - \alpha) \\ \sin(\frac{\pi}{2} - \beta) = \cos \beta \end{cases}$$

$$\cos \alpha = \sin \beta \Rightarrow \begin{cases} \cos \alpha = \sin(\frac{\pi}{2} - \alpha) \\ \cos(\frac{\pi}{2} - \beta) = \sin \beta \end{cases}$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

اتحادهای مثلثاتی در یک مثلث قائم الزویه ($\alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$, $a^2 + b^2 = c^2$)

$$\begin{aligned} \sin \alpha &= \frac{a}{c}, & \cos \alpha &= \frac{b}{c} \\ \tan \alpha &= \frac{a}{b}, & \cot \alpha &= \frac{b}{a} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sin \beta &= \frac{b}{c}, & \cos \beta &= \frac{a}{c} \\ \tan \beta &= \frac{b}{a}, & \cot \beta &= \frac{a}{b} \end{aligned}$$


$$\tan \alpha = \frac{1}{\cot \alpha} \Rightarrow \boxed{\tan \alpha \cot \alpha = 1}, \quad \tan \beta = \frac{1}{\cot \beta} \Rightarrow \boxed{\tan \beta \cot \beta = 1}$$

$$\tan \alpha = \cot \beta \Rightarrow \begin{cases} \tan \alpha = \cot(\frac{\pi}{2} - \alpha) \\ \tan(\frac{\pi}{2} - \beta) = \cot \beta \end{cases}$$

$$\cot \alpha = \tan \beta \Rightarrow \begin{cases} \cot \alpha = \tan(\frac{\pi}{2} - \alpha) \\ \cot(\frac{\pi}{2} - \beta) = \tan \beta \end{cases}$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

اتحادهای مثلثاتی




در یک مثلث قائم الزاویه ($\alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$, $a^2 + b^2 = c^2$)

$$\tan \alpha = \frac{\text{ضلع مقابل}}{\text{ضلع مجاور}} = \frac{a}{b} = \frac{\left(\frac{\text{ضلع مقابل}}{\text{وتر}}\right)}{\left(\frac{\text{ضلع مجاور}}{\text{وتر}}\right)} = \frac{\left(\frac{a}{c}\right)}{\left(\frac{b}{c}\right)} = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \Rightarrow \boxed{\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}}$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

اتحادهای مثلثاتی




در یک مثلث قائم الزاویه ($\alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$, $a^2 + b^2 = c^2$)

$$\cot \alpha = \frac{\text{ضلع مجاور}}{\text{ضلع مقابل}} = \frac{b}{a} = \frac{\left(\frac{\text{ضلع مجاور}}{\text{وتر}}\right)}{\left(\frac{\text{ضلع مقابل}}{\text{وتر}}\right)} = \frac{\left(\frac{b}{c}\right)}{\left(\frac{a}{c}\right)} = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} \Rightarrow \boxed{\cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}}$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

اتحادهای مثلثاتی




در یک مثلث قائم الزاویه ($\alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$, $a^2 + b^2 = c^2$)

$$a^2 + b^2 = c^2 \xrightarrow{\div c^2} \left(\frac{a}{c}\right)^2 + \left(\frac{b}{c}\right)^2 = 1$$

$$\sin \alpha = \frac{a}{c}, \quad \cos \alpha = \frac{b}{c} \Rightarrow \boxed{\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1}$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

اتحادهای مثلثاتی



در یک مثلث قائم الزاویه ($\alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$, $a^2 + b^2 = c^2$)

$$a^2 + b^2 = c^2 \xrightarrow{\div c^2} \left(\frac{a}{c}\right)^2 + \left(\frac{b}{c}\right)^2 = 1$$

$$\sin \beta = \frac{b}{c}, \quad \cos \beta = \frac{a}{c} \Rightarrow \boxed{\sin^2 \beta + \cos^2 \beta = 1}$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

اتحادهای مثلثاتی

$$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$$

$$\cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$$

$$\tan \alpha \cot \alpha = 1$$

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

$$1 + \tan^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha}$$

$$1 + \cot^2 \alpha = \frac{1}{\sin^2 \alpha}$$

$$\sin(-\alpha) = -\sin \alpha \quad \text{تابع فرد}$$

$$\cos(-\alpha) = \cos \alpha \quad \text{تابع زوج}$$

$$\tan(-\alpha) = -\tan \alpha \quad \text{تابع فرد}$$

$$\cot(-\alpha) = -\cot \alpha \quad \text{تابع فرد}$$

تعریف تابع فرد و تابع زوج:

$f(-x) = -f(x)$ تابع فرد,	$f(-x) = f(x)$ تابع زوج
---------------------------	-------------------------

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

اتحادهای مثلثاتی

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$$

$$\sin(\alpha + \pi) = -\sin \alpha$$

$$\cos(\alpha + \pi) = -\cos \alpha$$

$$\sin(\alpha - \pi) = -\sin \alpha$$

$$\cos(\alpha - \pi) = -\cos \alpha$$

$$\sin\left(\alpha + \frac{\pi}{2}\right) = \cos \alpha$$

$$\cos\left(\alpha + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin \alpha$$

$$\sin\left(\alpha - \frac{\pi}{2}\right) = -\cos \alpha$$

$$\cos\left(\alpha - \frac{\pi}{2}\right) = \sin \alpha$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

اتحادهای مثلثاتی

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$$

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

$$\cos 2\alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1$$

$$\cos 2\alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha$$

$$\sin 3\alpha = 3 \sin \alpha - 4 \sin^3 \alpha$$

$$\cos 3\alpha = 4 \cos^3 \alpha - 3 \cos \alpha$$

$$\cos^2 \alpha = \frac{1}{2}(1 + \cos 2\alpha)$$

$$\sin^2 \alpha = \frac{1}{2}(1 - \cos 2\alpha)$$

$$\sin^3 \alpha = \frac{3}{4} \sin \alpha - \frac{1}{4} \sin 3\alpha$$

$$\cos^3 \alpha = \frac{3}{4} \cos \alpha + \frac{1}{4} \cos 3\alpha$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

اتحادهای مثلثاتی

$$\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan \alpha \pm \tan \beta}{1 \mp \tan \alpha \tan \beta}$$

$$\cot(\alpha \pm \beta) = \frac{\cot \alpha \mp \cot \beta}{1 \pm \cot \alpha \cot \beta}$$

$$\tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$$

$$\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$$

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)]$$

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha - \beta) + \sin(\alpha + \beta)]$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

اتحادهای مثلثاتی

$$\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{1}{2}(\alpha + \beta) \cos \frac{1}{2}(\alpha - \beta)$$

$$\sin \alpha - \sin \beta = 2 \sin \frac{1}{2}(\alpha - \beta) \cos \frac{1}{2}(\alpha + \beta)$$

$$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{1}{2}(\alpha + \beta) \cos \frac{1}{2}(\alpha - \beta)$$

$$\cos \alpha - \cos \beta = 2 \sin \frac{1}{2}(\alpha - \beta) \sin \frac{1}{2}(\alpha + \beta)$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

اتحادهای مثلثاتی

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

$$\sin 2\alpha = \sin(\alpha + \alpha) = \sin \alpha \cos \alpha + \cos \alpha \sin \alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

$$\cos 2\alpha = \cos(\alpha + \alpha) = \cos \alpha \cos \alpha - \sin \alpha \sin \alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

$$\begin{aligned} \tan(\alpha + \beta) &= \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\cos(\alpha + \beta)} = \frac{\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta}{\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta} \\ &= \frac{\frac{\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta}{\cos \alpha \cos \beta}}{\frac{\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta}{\cos \alpha \cos \beta}} = \frac{\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} + \frac{\sin \beta}{\cos \beta}}{1 - \frac{\sin \alpha \sin \beta}{\cos \alpha \cos \beta}} = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta} \end{aligned}$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

اتحادهای مثلثاتی

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$$

$$\begin{aligned}\tan(\alpha - \beta) &= \frac{\sin(\alpha - \beta)}{\cos(\alpha - \beta)} = \frac{\sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta}{\cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta} \\ &= \frac{\frac{\sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta}{\cos \alpha \cos \beta}}{\frac{\cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta}{\cos \alpha \cos \beta}} = \frac{\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} - \frac{\sin \beta}{\cos \beta}}{1 + \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \frac{\sin \beta}{\cos \beta}} = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta}\end{aligned}$$

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}$$

$$\tan 2\alpha = \tan(\alpha + \alpha) = \frac{\tan \alpha + \tan \alpha}{1 - \tan \alpha \tan \alpha} = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

اتحادهای مثلثاتی

$$\begin{aligned}\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta &= \sin(\alpha + \beta) \\ \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta &= \sin(\alpha - \beta) + \\ \hline 2 \sin \alpha \cos \beta &= \sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)\end{aligned}$$

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2}(\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta))$$

$$\begin{aligned}\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta &= \cos(\alpha + \beta) \\ \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta &= \cos(\alpha - \beta) + \\ \hline 2 \cos \alpha \cos \beta &= \cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)\end{aligned}$$

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2}(\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta))$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

اتحادهای مثلثاتی

$$\cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta = \cos(\alpha - \beta)$$

$$\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta = \cos(\alpha + \beta) -$$


$$\frac{2 \sin \alpha \sin \beta = \cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)}{2 \sin \alpha \sin \beta = \cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)}$$

$$\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2}(\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta))$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

نمودار توابع مثلثاتی

$$y = \sin x$$




$\pi/2$	$\pi/3$	$\pi/4$	$\pi/6$	0	x
1	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{2}/2$	$1/2$	0	$\sin(x)$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

نمودار توابع مثلثاتی


$$y = \sin 2x$$



مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک


نمودار توابع مثلثاتی

$$y = \sin \frac{x}{2}$$



مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک


نمودار توابع مثلثاتی



مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

نمودار توابع مثلثاتی

$$y = \cos x$$




$\pi/2$	$\pi/3$	$\pi/4$	$\pi/6$	0	x
0	$1/2$	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{3}/2$	1	$\cos(x)$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

نمودار توابع مثلثاتی


$$y = \cos 2x$$



مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک


نمودار توابع مثلثاتی

$$y = \cos \frac{x}{2}$$



مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک


نمودار توابع مثلثاتی



مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

نمودار توابع مثلثاتی


$$y = \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}, \quad \pm\infty = \pm\frac{1}{0}$$



مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

نمودار توابع مثلثاتی


$$y = \cot x = \frac{\cos x}{\sin x}, \quad \pm\infty = \pm\frac{1}{0}$$



مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

نمودار توابع مثلثاتی

$$\cos \pi x, \quad \sin \pi x, \quad -\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{5}{2}$$



مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

فاز در توابع مثلثاتی
نوسانات وابسته به زمان

$$y = A \sin(\omega t + \phi), \quad \omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$$

◀ دیمانسیون فرکانس زاویه‌ای ω

$$[\omega] = \frac{\text{رادیان}}{\text{زمان}}$$

◀ دیمانسیون فاز ϕ

$$[\phi] = \text{رادیان}$$

◀ دیمانسیون فرکانس f

$$[f] = \frac{1}{\text{زمان}}$$

◀ دیمانسیون دوره تناوب T

$$[T] = \text{زمان}$$

دیمانسیون آرگومان تابع سینوس (یا تابع کوسینوس) $\omega t + \phi$

$$[\omega t + \phi] = \text{رادیان}$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

فاز در توابع مثلثاتی
نوسانات وابسته به مکان

$$y = A \sin(kx + \phi), \quad k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

◀ دیمانسیون طول موج λ ▶ دیمانسیون فاز ϕ

$[\lambda] = \text{طول}$ $[\phi] = \text{رادیان}$

◀ دیمانسیون عدد موج k

$$[k] = \frac{\text{رادیان}}{\text{طول}}$$


دیمانسیون آرگومان تابع سینوس (یا تابع کسینوس) $kx + \phi$

$[kx + \phi] = \text{رادیان}$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

نمودار توابع مثلثاتی با فاز اولیه

$$\sin(x + \pi/3), \quad \sin(x - \pi/6), \quad \sin x$$




$$\sin(x + \pi/3) = \sin x \cos \pi/3 + \cos x \sin \pi/3 = \frac{1}{2} \sin x + \frac{\sqrt{3}}{2} \cos x$$

$$\sin(x - \pi/6) = \sin x \cos \pi/6 - \cos x \sin \pi/6 = \frac{\sqrt{3}}{2} \sin x - \frac{1}{2} \cos x$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

نمودار توابع مثلثاتی با فاز اولیه

$$\cos(x + \pi/3), \quad \cos(x - \pi/6), \quad \cos x$$



$$\cos(x + \pi/3) = \cos x \cos \pi/3 - \sin x \sin \pi/3 = \frac{1}{2} \cos x - \frac{\sqrt{3}}{2} \sin x$$

$$\cos(x - \pi/6) = \cos x \cos \pi/6 + \sin x \sin \pi/6 = \frac{\sqrt{3}}{2} \cos x + \frac{1}{2} \sin x$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

برهم‌نهی نوسانات مثلثاتی متعامد با فرکانس نوسانات یکسان

اگر $A, B > 0$

◀ حالت اول

$$A \sin \omega t + B \cos \omega t = \sqrt{A^2 + B^2} \cos(\omega t - \phi)$$

$$A \sin \omega t - B \cos \omega t = \sqrt{A^2 + B^2} \cos(\omega t + \phi \pm \pi)$$

$$-A \sin \omega t + B \cos \omega t = \sqrt{A^2 + B^2} \cos(\omega t + \phi)$$

$$\tan \phi = \frac{A}{B}$$

$$\phi = \tan^{-1} \left(\frac{A}{B} \right)$$

ک

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

برهم‌نهی نوسانات مثلثاتی متعامد با فرکانس نوسانات یکسان

اگر $A, B > 0$

◀ حالت دوم

$$A \sin \omega t + B \cos \omega t = \sqrt{A^2 + B^2} \sin(\omega t + \psi)$$

$$A \sin \omega t - B \cos \omega t = \sqrt{A^2 + B^2} \sin(\omega t - \psi)$$

$$-A \sin \omega t + B \cos \omega t = \sqrt{A^2 + B^2} \sin(\omega t + \psi \pm \pi)$$

$$\tan \psi = \frac{B}{A}$$


$$\psi = \tan^{-1} \left(\frac{B}{A} \right)$$

ک

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

نمودار برهم‌نهی نوسانات مثلثاتی متعامد با فرکانس نوسانات یکسان


$$\sin x + 2 \cos x = \sqrt{5} \cos(x - \tan^{-1}(1/2))$$



مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

نمودار برهم‌نهی نوسانات مثلثاتی متعامد با فرکانس نوسانات یکسان

$$\sin x + 2 \cos x = \sqrt{5} \sin(x + \tan^{-1}(2))$$



مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

معکوس توابع مثلثاتی

$$y = \sin x : x = \sin^{-1} y$$

$$y = \cos x : x = \cos^{-1} y$$

1	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{2}/2$	1/2	0	y
$\pi/2$	$\pi/3$	$\pi/4$	$\pi/6$	0	$\sin^{-1}(y)$
0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$	$\cos^{-1}(y)$

$$\sin^{-1}(y) + \cos^{-1}(y) = \frac{\pi}{2}$$

$$\sin^{-1}(-y) = -\sin^{-1} y$$

$$\cos^{-1}(-y) = \pi - \cos^{-1} y$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

معکوس توابع مثلثاتی

$$y = \tan x : x = \tan^{-1} y$$

$$y = \cot x : x = \cot^{-1} y$$

∞	$\sqrt{3}$	1	$\sqrt{3}/3$	0	y
$\pi/2$	$\pi/3$	$\pi/4$	$\pi/6$	0	$\tan^{-1}(y)$
0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$	$\cot^{-1}(y)$


$$\tan^{-1}(y) + \cot^{-1}(y) = \frac{\pi}{2}$$

$$\tan^{-1}(-y) = -\tan^{-1} y$$

$$\cot^{-1}(-y) = \pi - \cot^{-1} y$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

معکوس توابع مثلثاتی




$$y = \sin^{-1} x$$

$$-1 \leq x \leq 1$$

$$-\frac{\pi}{2} \leq \sin^{-1} x \leq \frac{\pi}{2}$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

معکوس توابع مثلثاتی




$$y = \cos^{-1} x$$

$$-1 \leq x \leq 1$$

$$0 \leq \cos^{-1} x \leq \pi$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

معکوس توابع مثلثاتی




$$y = \tan^{-1} x$$

$$-\infty \leq x \leq \infty$$

$$-\frac{\pi}{2} \leq \tan^{-1} x \leq \frac{\pi}{2}$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

معکوس توابع مثلثاتی



$$y = \cot^{-1} x$$

$$y = \frac{\pi}{2} - \tan^{-1} x$$

$$-\infty \leq x \leq \infty$$

$$0 \leq \cot^{-1} x \leq \pi$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

اعداد مختلط

قسمت موهومی $\times i$ + قسمت حقیقی = عدد مختلط

$$z = x + iy, \quad i^2 = -1$$

$$\mathcal{R}[z] = x, \quad \mathcal{I}[z] = y$$

◀ تساوی دو عدد مختلط

$$z = z' : \quad x + iy = x' + iy'$$

$$x = x', \quad y = y'$$

◀ همیوگ مختلط یا مزدوج مختلط (Complex Conjugate)

$$z = x + iy \xrightarrow{\text{همیوگ مختلط}} z^* = x - iy$$

$$|z|^2 = zz^* = z^*z = (x + iy)(x - iy) = x^2 + y^2$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

اعداد مختلط

◀ جمع و تفریق دو عدد مختلط

$$z_1 \pm z_2 = (x_1 + iy_1) \pm (x_2 + iy_2)$$

$$z_1 \pm z_2 = (x_1 \pm x_2) + i(y_1 \pm y_2)$$

$$\mathcal{R}[z_1 \pm z_2] = x_1 \pm x_2, \quad \mathcal{I}[z_1 \pm z_2] = y_1 \pm y_2$$

◀ ضرب دو عدد مختلط

$$z_1 z_2 = (x_1 + iy_1)(x_2 + iy_2)$$

$$z_1 z_2 = x_1 x_2 + iy_1 x_2 + ix_1 y_2 + i^2 y_1 y_2$$

$$z_1 z_2 = (x_1 x_2 - y_1 y_2) + i(y_1 x_2 + x_1 y_2)$$

$$\mathcal{R}[z_1 z_2] = x_1 x_2 - y_1 y_2, \quad \mathcal{I}[z_1 z_2] = y_1 x_2 + x_1 y_2$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

اعداد مختلط

◀ تقسیم دو عدد مختلط

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{x_1 + iy_1}{x_2 + iy_2}$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1 z_2^*}{z_2 z_2^*} = \frac{(x_1 + iy_1)(x_2 - iy_2)}{(x_2 + iy_2)(x_2 - iy_2)}$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1 z_2^*}{|z_2|^2} = \frac{(x_1 x_2 + y_1 y_2) + i(y_1 x_2 - x_1 y_2)}{x_2^2 + y_2^2}$$

$$\mathcal{R} \left[\frac{z_1}{z_2} \right] = \frac{x_1 x_2 + y_1 y_2}{x_2^2 + y_2^2}, \quad \mathcal{I} \left[\frac{z_1}{z_2} \right] = \frac{y_1 x_2 - x_1 y_2}{x_2^2 + y_2^2}$$


مثال:

$$z = \frac{1}{i} = \frac{i}{ii} = \frac{i}{i^2} = \frac{i}{-1} = -i$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

اعداد مختلط

فرمول اولر (Euler)



$$z = x + iy$$

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2} = r$$

$$z = |z| \left(\frac{x}{|z|} + i \frac{y}{|z|} \right)$$

$$z = r \left(\frac{x}{r} + i \frac{y}{r} \right)$$

اگر

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta$$

$$x/r = \cos \theta, \quad y/r = \sin \theta$$

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta), \quad \theta = \tan^{-1}(y/x)$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

اعداد مختلط

فرمول اولر (Euler)

$$z = x + iy$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \theta = \tan^{-1}(y/x)$$

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta),$$

$e = 2.71828182842 \dots$: عدد اولر یا ثابت e $\cos \theta + i \sin \theta = e^{i\theta}$: فرمول اولر

$$z = x + iy = r(\cos \theta + i \sin \theta) = re^{i\theta}$$

توان در اعداد مختلط ◀

$$z^n = (x + iy)^n = (re^{i\theta})^n$$

$$z^n = r^n e^{in\theta} = r^n (\cos n\theta + i \sin n\theta) = r^n \cos n\theta + ir^n \sin n\theta$$

$$\mathcal{R}[z] = r^n \cos n\theta, \quad \mathcal{I}[z] = r^n \sin n\theta$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

اعداد مختلط

فرمول اولر (Euler)

$$\cos \theta + i \sin \theta = e^{i\theta}$$

توابع مثلثاتی با استفاده از فرمول اولر

$$\cos \theta + i \sin \theta = e^{i\theta} \xrightarrow[i \rightarrow -i]{\text{همیوگ مختلط}} \cos \theta - i \sin \theta = e^{-i\theta}$$

$$\begin{aligned} \cos \theta + i \sin \theta &= e^{i\theta} \\ \cos \theta - i \sin \theta &= e^{-i\theta} + \\ \hline 2 \cos \theta &= e^{i\theta} + e^{-i\theta} \end{aligned}$$

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$$

نکته: بعد (یا دیمانسیون) کمیت θ رادیان است.

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

اعداد مختلط

فرمول اولر (Euler)

$$\cos \theta + i \sin \theta = e^{i\theta}$$

توابع مثلثاتی با استفاده از فرمول اولر

$$\cos \theta + i \sin \theta = e^{i\theta} \xrightarrow[i \rightarrow -i]{\text{همیوگ مختلط}} \cos \theta - i \sin \theta = e^{-i\theta}$$

$$\begin{aligned} \cos \theta + i \sin \theta &= e^{i\theta} \\ \cos \theta - i \sin \theta &= e^{-i\theta} \\ \hline 2i \sin \theta &= e^{i\theta} - e^{-i\theta} \end{aligned}$$

$$\sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

اعداد مختلط

فرمول اولر (Euler)

$$\cos \theta + i \sin \theta = e^{i\theta}$$

توابع مثلثاتی با استفاده از فرمول اولر

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}, \quad \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

$$\tan \theta = \frac{1}{i} \left(\frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{e^{i\theta} + e^{-i\theta}} \right)$$

$$\tan \theta = \frac{i}{i^2} \left(\frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{e^{i\theta} + e^{-i\theta}} \right), \quad i^2 = -1$$

$$\tan \theta = -i \left(\frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{e^{i\theta} + e^{-i\theta}} \right)$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

اعداد مختلط

فرمول اولر (Euler)

$$\cos \theta + i \sin \theta = e^{i\theta}$$

توابع مثلثاتی با استفاده از فرمول اولر

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}, \quad \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

$$\tan \theta = -i \left(\frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{e^{i\theta} + e^{-i\theta}} \right)$$

$$\cot \theta = \frac{1}{\tan \theta}$$

$$\cot \theta = i \left(\frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{e^{i\theta} - e^{-i\theta}} \right)$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

اعداد مختلط

فرمول اولر (Euler)

$$\cos \theta + i \sin \theta = e^{i\theta}$$

توابع مثلثاتی با استفاده از فرمول اولر

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$$

$$\sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

$$\tan \theta = -i \left(\frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{e^{i\theta} + e^{-i\theta}} \right)$$

$$\cot \theta = i \left(\frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{e^{i\theta} - e^{-i\theta}} \right)$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

اعداد مختلط

فرمول اولر (Euler)

بعد (یا دیمانسیون) θ در $e^{\pm i\theta}$ رادیان است:

◀ اگر در

$$e^{\pm ikx}$$

کمیت x بعد طول داشته باشد، در این صورت کمیت k بعد رادیان بر روی طول خواهد داشت،

$$[k] = \frac{\text{رادیان}}{\text{طول}}$$

◀ اگر در

$$e^{\pm i\alpha t}$$

کمیت t بعد زمان داشته باشد، در این صورت کمیت α بعد رادیان بر روی زمان خواهد داشت،

$$[\alpha] = \frac{\text{رادیان}}{\text{زمان}}$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

اعداد مختلط

بررسی اتحادهای مثلثاتی با استفاده از فرمول اولر (Euler)

$$\begin{aligned}\sin \alpha \cos \beta + \sin \beta \cos \alpha &= \left(\frac{e^{i\alpha} - e^{-i\alpha}}{2i} \right) \left(\frac{e^{i\beta} + e^{-i\beta}}{2} \right) \\ &+ \left(\frac{e^{i\beta} - e^{-i\beta}}{2i} \right) \left(\frac{e^{i\alpha} + e^{-i\alpha}}{2} \right) \\ &= \frac{e^{i(\alpha+\beta)} + e^{i(\alpha-\beta)} - e^{i(-\alpha+\beta)} - e^{-i(\alpha+\beta)}}{4i} \\ &+ \frac{e^{i(\alpha+\beta)} + e^{i(\beta-\alpha)} - e^{i(-\beta+\alpha)} - e^{-i(\alpha+\beta)}}{4i} \\ &= \frac{2e^{i(\alpha+\beta)} - 2e^{-i(\alpha+\beta)}}{4i} \\ &= \frac{e^{i(\alpha+\beta)} - e^{-i(\alpha+\beta)}}{2i} = \sin(\alpha + \beta)\end{aligned}$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

اعداد مختلط

بررسی اتحادهای مثلثاتی با استفاده از فرمول اولر (Euler)

$$\begin{aligned}\sin \alpha \cos \beta - \sin \beta \cos \alpha &= \left(\frac{e^{i\alpha} - e^{-i\alpha}}{2i} \right) \left(\frac{e^{i\beta} + e^{-i\beta}}{2} \right) \\ &- \left(\frac{e^{i\beta} - e^{-i\beta}}{2i} \right) \left(\frac{e^{i\alpha} + e^{-i\alpha}}{2} \right) \\ &= \frac{e^{i(\alpha+\beta)} + e^{i(\alpha-\beta)} - e^{i(-\alpha+\beta)} - e^{-i(\alpha+\beta)}}{4i} \\ &- \frac{e^{i(\alpha+\beta)} + e^{i(\beta-\alpha)} - e^{i(-\beta+\alpha)} - e^{-i(\alpha+\beta)}}{4i} \\ &= \frac{2e^{i(\alpha-\beta)} - 2e^{-i(\alpha-\beta)}}{4i} \\ &= \frac{e^{i(\alpha-\beta)} - e^{-i(\alpha-\beta)}}{2i} = \sin(\alpha - \beta)\end{aligned}$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

اعداد مختلط

بررسی اتحادهای مثلثاتی با استفاده از فرمول اولر (Euler)

$$\begin{aligned}\cos \alpha \cos \beta - \sin \beta \sin \alpha &= \left(\frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} \right) \left(\frac{e^{i\beta} + e^{-i\beta}}{2} \right) \\ &- \left(\frac{e^{i\beta} - e^{-i\beta}}{2i} \right) \left(\frac{e^{i\alpha} - e^{-i\alpha}}{2i} \right) \\ &= \frac{e^{i(\alpha+\beta)} + e^{i(\alpha-\beta)} + e^{i(-\alpha+\beta)} + e^{-i(\alpha+\beta)}}{4} \\ &- \frac{e^{i(\alpha+\beta)} - e^{i(\beta-\alpha)} - e^{i(-\beta+\alpha)} + e^{-i(\alpha+\beta)}}{(-4)} \\ &= \frac{2e^{i(\alpha+\beta)} + 2e^{-i(\alpha+\beta)}}{4} \\ &= \frac{e^{i(\alpha+\beta)} + e^{-i(\alpha+\beta)}}{2} = \cos(\alpha + \beta)\end{aligned}$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

اعداد مختلط

بررسی اتحادهای مثلثاتی با استفاده از فرمول اولر (Euler)

$$\begin{aligned}\cos \alpha \cos \beta + \sin \beta \sin \alpha &= \left(\frac{e^{i\alpha} + e^{-i\alpha}}{2} \right) \left(\frac{e^{i\beta} + e^{-i\beta}}{2} \right) \\ &+ \left(\frac{e^{iy} - e^{-iy}}{2i} \right) \left(\frac{e^{i\alpha} - e^{-i\alpha}}{2i} \right) \\ &= \frac{e^{i(\alpha+\beta)} + e^{i(\alpha-\beta)} + e^{i(-\alpha+y)} + e^{-i(\alpha+\beta)}}{4} \\ &+ \frac{e^{i(\alpha+\beta)} - e^{i(y-\alpha)} - e^{i(-y+\alpha)} + e^{-i(\alpha+\beta)}}{(-4)} \\ &= \frac{2e^{i(\alpha-\beta)} + 2e^{-i(\alpha-\beta)}}{4} \\ &= \frac{e^{i(\alpha-\beta)} + e^{-i(\alpha-\beta)}}{2} = \cos(\alpha - \beta)\end{aligned}$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

اعداد مختلط

توابع مثلثاتی معکوس با استفاده از فرمول اولر (Euler)

$$y = \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}, \quad \theta = \sin^{-1} y$$

$$y = \frac{e^{2i\theta} - 1}{2ie^{i\theta}}$$

$$e^{2i\theta} - 2iye^{i\theta} - 1 = 0$$

$$e^{i\theta} = iy \pm \sqrt{1 - y^2}$$

$$\theta = \frac{1}{i} \ln(iy \pm \sqrt{1 - y^2})$$

$$\sin^{-1} y = \frac{1}{i} \ln(iy \pm \sqrt{1 - y^2})$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

اعداد مختلط

توابع مثلثاتی معکوس با استفاده از فرمول اولر (Euler)

$$y = \cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}, \quad \theta = \cos^{-1} y$$

$$y = \frac{e^{2i\theta} + 1}{2e^{i\theta}}$$

$$e^{2i\theta} - 2ye^{i\theta} + 1 = 0$$

$$e^{i\theta} = y \pm \sqrt{y^2 - 1}$$

$$\theta = \frac{1}{i} \ln(y \pm \sqrt{y^2 - 1})$$

$$\cos^{-1} y = \frac{1}{i} \ln(y \pm \sqrt{y^2 - 1})$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

اعداد مختلط

توابع مثلثاتی معکوس با استفاده از فرمول اولر (Euler)

$$y = \tan \theta = \frac{1}{i} \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}, \quad \theta = \tan^{-1} y$$

$$y = \frac{1}{i} \frac{e^{2i\theta} - 1}{e^{2i\theta} + 1}$$

$$iye^{2i\theta} + iy = e^{2i\theta} - 1$$

$$e^{2i\theta} = \frac{1 + iy}{1 - iy}$$

$$\theta = \frac{1}{2i} \ln \left(\frac{1 + iy}{1 - iy} \right)$$

$$\tan^{-1} y = \frac{1}{2i} \ln \left(\frac{1 + iy}{1 - iy} \right)$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

اعداد مختلط

توابع مثلثاتی معکوس با استفاده از فرمول اولر (Euler)

$$y = \cot \theta = i \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}, \quad \theta = \cot^{-1} y$$

$$y = i \frac{e^{2i\theta} + 1}{e^{2i\theta} - 1}$$

$$ye^{2i\theta} - y = ie^{2i\theta} + i$$

$$e^{2i\theta} = \frac{y + i}{y - i}$$

$$\theta = \frac{1}{2i} \ln \left(\frac{y + i}{y - i} \right)$$


$$\cot^{-1} y = \frac{1}{2i} \ln \left(\frac{y + i}{y - i} \right)$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

توابع نمایی (Exponential)

$$a^{\pm x}, \quad x \in [-\infty, \infty]$$

مثال




نکته: هر عددی به توان صفر، مقدار ۱ را بدست می‌دهد، $a^0 = 1$.

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

توابع نمایی (Exponential)

$$a^{\pm x}, \quad x \in [-\infty, \infty], \quad a^{\pm x} > 0$$

مثال



مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

توابع نمایی (Exponential)

$$a^{\pm x}, \quad x \in [-\infty, \infty], \quad a^{\pm x} > 0$$

رفتار حدی

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x \rightarrow +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} a^{-x} = 0$$


$$\lim_{x \rightarrow -\infty} a^{-x} \rightarrow +\infty$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

توابع نمایی (Exponential)

$$e^{\pm x}, \quad x \in [-\infty, \infty], \quad e^{\pm x} > 0$$

مثال



مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

توابع نمایی (Exponential)

$$e^{\pm x}, \quad x \in [-\infty, \infty], \quad e^{\pm x} > 0$$

رفتار حدی

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x \rightarrow +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0$$


$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} \rightarrow +\infty$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

توابع نمایی (Exponential)

$$e^{\pm x}, \quad x \in [0, \infty]$$

رفتار حدی



$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x \rightarrow +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x \rightarrow \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} a^{-x} = 0$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

توابع نمایی (Exponential)

آرگومان توابع نمایی بدون بعد (یا بدون دیمانسیون) هستند:

◀ اگر در

$$e^{\pm kx}$$

کمیت x بعد طول داشته باشد، در این صورت کمیت k بعد یک بر روی طول خواهد داشت،

$$[k] = \frac{1}{\text{طول}}$$

◀ اگر در

$$e^{\pm \alpha t}$$

کمیت t بعد زمان داشته باشد، در این صورت کمیت α بعد یک بر روی زمان خواهد داشت،

$$[\alpha] = \frac{1}{\text{زمان}}$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

توابع لگاریتمی (Logarithm)

$$\log_b x, \quad b = \text{پایه (Base)}, \quad x > 0$$

◀ مقادیر مجاز پایه

$$b > 0 \quad \text{و} \quad b \neq 1$$

◀ اگر $x = b$ باشد،

$$\log_b b = 1$$

◀ اگر $x = b^a$ باشد،

$$\log_b b^a = a \log_b b = a$$

◀ تابع لگاریتم معکوس تابع نمایی است. اگر

$$x = b^y$$


و از طرفین لگاریتم گرفته شود،

$$\log_b x = \log_b(b^y) = y \log_b b = y$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

توابع لگاریتمی (Logarithm)


$$\log_b x, \quad b = \text{پایه (Base)}, \quad x > 0$$



مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

توابع لگاریتمی (Logarithm)


$$\log_b x, \quad b = \text{پایه (Base)}, \quad x > 0$$



مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

توابع لگاریتمی (Logarithm)


$$\log_e x = \log x = \ln x, \quad x > 0$$



مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

توابع لگاریتمی (Logarithm)


$$\log_b x, \quad b^x$$



مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

توابع لگاریتمی (Logarithm)

$$\log_b x, \quad b^x$$



مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

توابع لگاریتمی (Logarithm)

$$\log_b x, \quad b = \text{پایه (Base)}, \quad x > 0$$

◀ تغییر پایه،

$$\frac{\log_b x}{\log_b c} = \log_c x$$

◀ جمع،

$$\log_b x_1 + \log_b x_2 = \log_b (x_1 x_2)$$

◀ تفریق،

$$\log_b x_1 - \log_b x_2 = \log_b \left(\frac{x_1}{x_2} \right)$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

توابع هیپربولیکی

◀ کوسینوس هیپربولیک

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

◀ سینوس هیپربولیک

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

◀ تانژانت هیپربولیک

$$\tanh x = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

◀ کُتانژانت هیپربولیک

$$\coth x = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

توابع هیپربولیکی

◀ کوسینوس هیپربولیک یک تابع زوج است،

$$x \rightarrow -x : \quad \cosh(-x) = \frac{e^{-x} + e^x}{2} = \cosh x$$

◀ سینوس هیپربولیک یک تابع فرد است،

$$x \rightarrow -x : \quad \sinh(-x) = \frac{e^{-x} - e^x}{2} = -\frac{e^x - e^{-x}}{2} = -\sinh x$$

◀ تانژانت هیپربولیک یک تابع فرد است،

$$x \rightarrow -x : \quad \tanh(-x) = \frac{e^{-x} - e^x}{e^{-x} + e^x} = -\frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} = -\tanh x$$

◀ کتانژانت هیپربولیک یک تابع فرد است،

$$x \rightarrow -x : \quad \coth(-x) = \frac{e^{-x} + e^x}{e^{-x} - e^x} = -\frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}} = -\coth x$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

توابع هیپربولیکی

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \quad \cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}$$

◀ رابطه کوسینوس و کوسینوس هیپربولیک

$$x \rightarrow ix : \quad \cosh(ix) = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} = \cos x \Rightarrow \boxed{\cosh(ix) = \cos(x)}$$

و

$$x \rightarrow -ix : \quad \cosh(-i^2x) = \cos(-ix) \Rightarrow \boxed{\cosh(x) = \cos(ix)}$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

توابع هیپربولیکی

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \quad \sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}$$

◀ رابطه سینوس و سینوس هیپربولیک

$$x \rightarrow ix : \quad \sinh(ix) = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2} = i \sin x \Rightarrow \boxed{\sinh(ix) = i \sin(x)}$$

و

$$x \rightarrow -ix : \quad \sinh(-i^2 x) = i \sin(-ix) \Rightarrow \sinh(x) = -i \sin(ix)$$

$$\boxed{i \sinh(x) = \sin(ix)}$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

توابع هیپربولیکی

$$\cosh(ix) = \cos(x), \quad \cosh(x) = \cos(ix)$$

$$\sinh(ix) = i \sin(x), \quad i \sinh(x) = \sin(ix)$$

◀ رابطه تانژانت و تانژانت هیپربولیک

$$\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x} = -i \frac{\sin(ix)}{\cos(ix)} = -i \tan(ix)$$

$$\tanh(ix) = \frac{\sinh(ix)}{\cosh(ix)} = \frac{i \sin(x)}{\cos(x)} = i \tan(x)$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

توابع هیپربولیکی

$$\cosh(ix) = \cos(x), \quad \cosh(x) = \cos(ix)$$

$$\sinh(ix) = i \sin(x), \quad i \sinh(x) = \sin(ix)$$

$$\tanh(ix) = i \tan(x), \quad i \tanh x = \tan(ix)$$

◀ رابطه کتانژانت و کتانژانت هیپربولیک

$$\coth x = \frac{\cosh x}{\sinh x} = i \frac{\cos(ix)}{\sin(ix)} = i \cot(ix)$$

$$\coth(ix) = \frac{\cosh(ix)}{\sinh(ix)} = \frac{\cos x}{i \sin x} = -i \cot x$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

توابع هیپربولیکی

◀ رابطه توابع مثلثاتی با توابع هیپربولیکی

$$\cosh(ix) = \cos(x), \quad \cosh(x) = \cos(ix)$$

$$\sinh(ix) = i \sin(x), \quad i \sinh(x) = \sin(ix)$$


$$\tanh(ix) = i \tan(x), \quad i \tanh x = \tan(ix)$$

$$\coth x = i \cot(ix), \quad \coth(ix) = -i \cot x$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

توابع هیپربولیکی


$$y = \sinh x = \frac{1}{2}e^x - \frac{1}{2}e^{-x}, \quad -\infty < x < \infty, \quad -\infty < y < \infty$$



مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

توابع هیپربولیکی


$$y = \cosh x = \frac{1}{2}e^x + \frac{1}{2}e^{-x}, \quad -\infty < x < \infty, \quad 1 \leq y < \infty$$



مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

توابع هیپربولیکی


$$y = \tanh x, \quad -\infty < x < \infty, \quad -1 < y < 1$$



مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

توابع هیپربولیکی

$$y = \coth x, \quad x > 0, \quad x < 0, \quad y > 1, \quad y < -1$$



مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

اتحادهای هیپربولیکی

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \quad \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

$$\boxed{\cosh x + \sinh x = e^x}$$

$$\boxed{\cosh x - \sinh x = e^{-x}}$$

$$\tanh = \frac{\sinh x}{\cosh x} = \frac{1}{\coth x} \Rightarrow \boxed{\tanh x \coth x = 1}$$

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = \frac{e^{2x} + 2 + e^{-2x}}{4} - \frac{e^{2x} - 2 + e^{-2x}}{4} = \frac{4}{4} = 1$$

$$\boxed{\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1}$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

اتحادهای هیپربولیکی

$$\frac{1}{\cosh^2 x} = \frac{\cosh^2 x - \sinh^2 x}{\cosh^2 x}$$

$$\frac{1}{\cosh^2 x} = 1 - \tanh^2 x$$

$$\frac{1}{\sinh^2 x} = \frac{\cosh^2 x - \sinh^2 x}{\sinh^2 x}$$

$$\frac{1}{\sinh^2 x} = \coth^2 x - 1$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

اتحادهای هیپربولیکی

$$\begin{aligned}\sinh x \cosh y + \sinh y \cosh x &= \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2} \right) \left(\frac{e^y + e^{-y}}{2} \right) \\ &+ \left(\frac{e^y - e^{-y}}{2} \right) \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right) \\ &= \frac{e^{x+y} + e^{x-y} - e^{-x+y} - e^{-(x+y)}}{4} \\ &+ \frac{e^{y+x} + e^{y-x} - e^{-y+x} - e^{-(x+y)}}{4} \\ &= \frac{2e^{y+x} - 2e^{-(x+y)}}{4} \\ &= \sinh(x + y)\end{aligned}$$

$$\sinh x \cosh y + \sinh y \cosh x = \sinh(x + y)$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

اتحادهای هیپربولیکی

$$\begin{aligned}\sinh x \cosh y - \sinh y \cosh x &= \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2} \right) \left(\frac{e^y + e^{-y}}{2} \right) \\ &- \left(\frac{e^y - e^{-y}}{2} \right) \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right) \\ &= \frac{e^{x+y} + e^{x-y} - e^{-x+y} - e^{-(x+y)}}{4} \\ &- \frac{e^{y+x} + e^{y-x} - e^{-y+x} - e^{-(x+y)}}{4} \\ &= \frac{2e^{x-y} - 2e^{-(x-y)}}{4} \\ &= \sinh(x - y)\end{aligned}$$

$$\sinh x \cosh y - \sinh y \cosh x = \sinh(x - y)$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

اتحادهای هیپربولیکی

$$\begin{aligned}\cosh x \cosh y + \sinh y \sinh x &= \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right) \left(\frac{e^y + e^{-y}}{2} \right) \\ &+ \left(\frac{e^y - e^{-y}}{2} \right) \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2} \right) \\ &= \frac{e^{x+y} + e^{x-y} + e^{-x+y} + e^{-(x+y)}}{4} \\ &+ \frac{e^{y+x} - e^{y-x} - e^{-y+x} + e^{-(x+y)}}{4} \\ &= \frac{2e^{x+y} + 2e^{-(x+y)}}{4} \\ &= \cosh(x + y)\end{aligned}$$

$$\cosh x \cosh y + \sinh y \sinh x = \cosh(x + y)$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

اتحادهای هیپربولیکی

$$\begin{aligned}\cosh x \cosh y - \sinh y \sinh x &= \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right) \left(\frac{e^y + e^{-y}}{2} \right) \\ &- \left(\frac{e^y - e^{-y}}{2} \right) \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2} \right) \\ &= \frac{e^{x+y} + e^{x-y} + e^{-x+y} + e^{-(x+y)}}{4} \\ &- \frac{e^{y+x} - e^{y-x} - e^{-y+x} + e^{-(x+y)}}{4} \\ &= \frac{2e^{x-y} + 2e^{-(x-y)}}{4} \\ &= \cosh(x - y)\end{aligned}$$

$$\boxed{\cosh x \cosh y - \sinh y \sinh x = \cosh(x - y)}$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

اتحادهای هیپربولیکی

$$\sinh x \cosh y + \sinh y \cosh x = \sinh(x + y)$$

$$\sinh 2x = 2 \sinh x \cosh x$$

$$\cosh x \cosh y + \sinh y \sinh x = \cosh(x + y)$$

$$\cosh 2x = \cosh^2 x + \sinh^2 x$$

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$$

$$\begin{aligned}\cosh 2x &= 2 \cosh^2 x - 1 \\ &= 2 \sinh^2 x + 1\end{aligned}$$

اگر

بنابراین

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

اتحادهای هیپربولیکی

$$\sinh x \cosh y + \sinh y \cosh x = \sinh(x + y)$$

$$\cosh x \cosh y + \sinh y \sinh x = \cosh(x + y)$$

$$\tanh(x + y) = \frac{\sinh(x + y)}{\cosh(x + y)} = \frac{\sinh x \cosh y + \sinh y \cosh x}{\cosh x \cosh y + \sinh y \sinh x}$$

$$\tanh(x + y) = \frac{\frac{\sinh x \cosh y + \sinh y \cosh x}{\cosh x \cosh y}}{\frac{\cosh x \cosh y + \sinh y \sinh x}{\cosh x \cosh y}}$$

$$\tanh(x + y) = \frac{\frac{\sinh x}{\cosh x} + \frac{\sinh y}{\cosh y}}{1 + \frac{\sinh y \sinh x}{\cosh x \cosh y}} \Rightarrow \boxed{\tanh(x + y) = \frac{\tanh x + \tanh y}{1 + \tanh x \tanh y}}$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

اتحادهای هیپربولیکی

$$\sinh x \cosh y - \sinh y \cosh x = \sinh(x - y)$$

$$\cosh x \cosh y - \sinh y \sinh x = \cosh(x - y)$$

$$\tanh(x - y) = \frac{\sinh(x - y)}{\cosh(x - y)} = \frac{\sinh x \cosh y - \sinh y \cosh x}{\cosh x \cosh y - \sinh y \sinh x}$$

$$\tanh(x - y) = \frac{\frac{\sinh x \cosh y - \sinh y \cosh x}{\cosh x \cosh y}}{\frac{\cosh x \cosh y - \sinh y \sinh x}{\cosh x \cosh y}}$$

$$\tanh(x - y) = \frac{\frac{\sinh x}{\cosh x} - \frac{\sinh y}{\cosh y}}{1 - \frac{\sinh y \sinh x}{\cosh x \cosh y}} \Rightarrow \boxed{\tanh(x - y) = \frac{\tanh x - \tanh y}{1 - \tanh x \tanh y}}$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

توابع هیپربولیکی معکوس

$$y = \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \quad -\infty < x < \infty, \quad -\infty < y < \infty$$

معکوس سینوس هیپربولیک

$$x = \sinh^{-1} y$$

$$e^{2x} - 2ye^x - 1 = 0$$

$$e^x = y \pm \sqrt{y^2 + 1}$$

چون همواره $e^x > 0$ است. بنابراین

$$e^x = y + \sqrt{y^2 + 1}$$

$$x = \ln[y + \sqrt{y^2 + 1}]$$

$$x = \sinh^{-1} y$$

$$\sinh^{-1} y = \ln[y + \sqrt{y^2 + 1}]$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

توابع هیپربولیکی معکوس

$$y = \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \quad -\infty < x < \infty, \quad 1 \leq y < \infty$$

معکوس کسینوس هیپربولیک

$$x = \cosh^{-1} y$$

$$e^{2x} - 2ye^x + 1 = 0$$

$$e^x = y \pm \sqrt{y^2 - 1}$$

چون همواره $e^x > 0$ است. بنابراین

$$e^x = y + \sqrt{y^2 - 1}$$

$$x = \ln[y + \sqrt{y^2 - 1}]$$

$$x = \cosh^{-1} y$$


$$\cosh^{-1} y = \ln[y + \sqrt{y^2 - 1}]$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

توابع هیپربولیکی معکوس

$$y = \sinh^{-1} x, \quad -\infty < x < \infty, \quad -\infty < y < \infty$$

$$y = \cosh^{-1} x, \quad x \geq 1, \quad y > 0$$



مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

توابع هیپربولیکی معکوس

$$y = \tanh x = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}, \quad -\infty < x < \infty, \quad -1 < y < 1$$

معکوس تانژانت هیپربولیک

$$x = \tanh^{-1} y$$

$$ye^{2x} + y = e^{2x} - 1 \Rightarrow (1 - y)e^{2x} = 1 + y$$

$$e^{2x} = \ln \left(\frac{1 + y}{1 - y} \right)$$

$$x = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1 + y}{1 - y} \right)$$

$$x = \tanh^{-1} y$$

$$\boxed{\tanh^{-1} y = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1 + y}{1 - y} \right)}$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

توابع هیپربولیکی معکوس

$$y = \coth x = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}, \quad x > 0, \quad x < 0, \quad y > 1, \quad y < -1$$

معکوس کتانژانت هیپربولیک

$$x = \coth^{-1} y$$

$$ye^{2x} - y = e^{2x} + 1 \Rightarrow (y - 1)e^{2x} = y + 1$$

$$e^{2x} = \ln \left(\frac{y + 1}{y - 1} \right)$$

$$x = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{y + 1}{y - 1} \right)$$

$$x = \coth^{-1} y$$


$$\coth^{-1} y = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{y + 1}{y - 1} \right)$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

توابع هیپربولیکی معکوس

$$y = \tanh^{-1} x, \quad -1 < x < 1, \quad -\infty < y < \infty$$

$$y = \coth^{-1} x, \quad x > 1 (y > 0), \quad x < -1 (y < 0)$$




مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

مشتق مرتبه اول

اگر $y = f(x)$ ، مشتق اول f یا y نسبت به x_0 بصورت زیر تعریف می شود،

$$f'(x_0) = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$




مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

مشتق مرتبه اول

اگر $y = f(x)$ ، مشتق اول f یا y نسبت به x_0 بصورت زیر تعریف می شود،

$$f'(x_0) = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$




مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

مشتق مرتبه اول

اگر $y = f(x)$ ، مشتق اول f یا y نسبت به x_0 بصورت زیر تعریف می شود،

$$f'(x_0) = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$




مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

مشتق مرتبه اول

اگر $y = f(x)$ ، مشتق اول f یا y نسبت به x_0 بصورت زیر تعریف می شود،

$$f'(x_0) = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$




مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

مشتق مرتبه اول


اگر $y = f(x)$ ، مشتق اول f یا y نسبت به x_0 بصورت زیر تعریف می شود،

$$f'(x_0) = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$




مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

مشتق مرتبه اول
ماکزیمم و مینیمم




مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

مشتق مرتبه اول
ماکزیمم و مینیمم




مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

مشتق مرتبه اول
ماکزیمم و مینیمم




مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

مشتق مرتبه اول
تغییرات منحنی (شیب مثبت)



مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

مشتق مرتبه اول
تغییرات منحنی (شیب منفی)



مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

مشتق مرتبه اول
توابع

$$f(x) = a, \quad a = \text{ثابت}$$

$$f'(x) = 0$$

مثال:

$$f(x) = -2.5, \quad f'(x) = 0$$

$$f(x) = ax, \quad a = \text{ثابت}$$

$$f'(x) = a$$

مثال:

$$f(x) = 5x - 1, \quad f'(x) = 5$$

$$f(x) = ax^n, \quad a = \text{ثابت}$$

$$f'(x) = nax^{n-1}$$

مثال:

$$f(x) = 2x^4, \quad f'(x) = 8x^3$$

مثال:

$$f(x) = 8\sqrt{x} = 8x^{\frac{1}{2}}$$

$$f'(x) = \frac{1}{2}8x^{\left(\frac{1}{2}-1\right)} = 4x^{-\frac{1}{2}}$$

$$f'(x) = \frac{4}{\sqrt{x}}$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

مشتق مرتبه اول
توابع

$$f(x) = [u(x)]^n$$

$$f'(x) = nu'(x)[u(x)]^{n-1}$$

مثال:

$$f(x) = (1 + x^2)^3$$

$$f'(x) = 3(2x)(1+x^2)^{3-1} = 6x(1+x^2)^2$$

مثال:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{1+x^2}} = (1+x^2)^{-\frac{1}{3}}$$

$$f'(x) = -\frac{1}{3}(2x)(1+x^2)^{-\frac{1}{3}-1}$$

$$f'(x) = -\frac{2}{3}x(1+x^2)^{-\frac{4}{3}}$$

$$f'(x) = -\frac{2x}{3\sqrt[3]{(1+x^2)^4}}$$

$$f(x) = u(x) \pm v(x)$$

$$f'(x) = u'(x) \pm v'(x)$$

مثال:

$$f(x) = 2x^3 - \sqrt{1+x^2}$$

$$f'(x) = 6x^2 - \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

مشتق مرتبه اول
توابع

$$f(x) = u(x)v(x)$$

$$f'(x) = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$$

مثال:

$$f(x) = x\sqrt{1+x^2}$$

$$f'(x) = \sqrt{1+x^2} + \frac{x^2}{\sqrt{1+x^2}}$$

مثال:

$$f(x) = (2x-1)(x+2)$$

$$f'(x) = 2(x+2) + (2x-1)$$

$$f'(x) = 4x + 3$$

$$f(x) = \frac{u(x)}{v(x)}$$

$$f'(x) = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{[v(x)]^2}$$

مثال:

$$f(x) = \frac{x+1}{x-1}$$

$$f'(x) = \frac{(x-1) - (x+1)}{(x-1)^2}$$

$$f'(x) = \frac{-2}{(x-1)^2}$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

مشتق مرتبه اول
توابع

مثال:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$$

$$f'(x) = \frac{0 \times \sqrt{1+x^2} - 1 \times \frac{d}{dx} \sqrt{1+x^2}}{[\sqrt{1+x^2}]^2}$$

$$f'(x) = \frac{-\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}}{[\sqrt{1+x^2}]^2}$$

$$f'(x) = -\frac{x}{(1+x^2)^{3/2}}$$

$$f(x) = \sqrt{\frac{x+1}{x-1}}$$

مثال:

$$f(x) = \left[\frac{x+1}{x-1} \right]^{1/2}$$

$$f'(x) = \frac{1}{2} \frac{d}{dx} \left(\frac{x+1}{x-1} \right) \left[\frac{x+1}{x-1} \right]^{-1/2}$$

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{x+1}{x-1} \right) = \frac{-2}{(x-1)^2}$$

$$f'(x) = -\frac{1}{(x-1)^2} \left[\frac{x+1}{x-1} \right]^{-1/2}$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

مشتق مرتبه اول
توابع

$$f(x) = \sin x$$

$$f'(x) = \cos x$$

$$f(x) = \cos x$$

$$f'(x) = -\sin x$$

$$f(x) = \tan x$$

$$f'(x) = (1 + \tan^2 x)$$

$$f(x) = \cot x$$

$$f'(x) = -(1 + \cot^2 x)$$

$$f(x) = \sin u(x)$$

$$f'(x) = u'(x) \cos x$$

$$f(x) = \cos u(x)$$

$$f'(x) = -u'(x) \sin u(x)$$

$$f(x) = \tan u(x)$$

$$f'(x) = u'(x)(1 + \tan^2 u(x))$$

$$f(x) = \cot u(x)$$

$$f'(x) = -u'(x)(1 + \cot^2 u(x))$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

مشتق مرتبه اول

توابع

مثال:

مثال:

$$f(x) = \sin(2x) = \sin u(x)$$

$$u(x) = 2x, u'(x) = 2$$

$$f'(x) = u'(x) \cos u(x)$$

$$f'(x) = 2 \cos(2x)$$

$$f(x) = \cos(3x) = \cos u(x)$$

$$u(x) = 3x, u'(x) = 3$$

$$f'(x) = -u'(x) \sin u(x)$$

$$f'(x) = -3 \sin(3x)$$

مثال:

مثال:

$$f(x) = \sin^2(2x) = \sin^2 u(x)$$

$$u(x) = 2x, u'(x) = 2$$

$$f'(x) = 2[u'(x) \cos u(x)] \sin^{2-1} u(x)$$

$$f'(x) = 4 \cos(2x) \sin(2x) = 2 \sin(4x)$$

$$f(x) = \cos^3(3x) = \cos^3 u(x)$$

$$u(x) = 3x, u'(x) = 3$$

$$f'(x) = -3[u'(x) \sin u(x)] \cos^{3-1} u(x)$$

$$f'(x) = -9 \sin(3x) \cos^2(3x)$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

مشتق مرتبه اول

توابع

مثال:

مثال:

$$f(x) = \tan(2x) = \tan u(x)$$

$$f(x) = \cot(3x) = \cot u(x)$$

$$u(x) = 2x, u'(x) = 2$$

$$u(x) = 3x, u'(x) = 3$$

$$f'(x) = u'(x)(1 + \tan^2 u(x))$$

$$f'(x) = -u'(x)(1 + \cot^2 u(x))$$

$$f'(x) = 2(1 + \tan^2(2x))$$

$$f'(x) = -3(1 + \cot^2(3x))$$

مثال:

$$f(x) = \tan^2(2x) = \tan^2 u(x)$$

$$u(x) = 2x, u'(x) = 2$$

$$f'(x) = 2[u'(x)(1 + \tan^2 u(x))] \tan^{2-1} u(x)$$

$$f'(x) = 4(1 + \tan^2(2x)) \tan(2x)$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

مشتق مرتبه اول

توابع

مثال:

$$f(x) = \cot^3(3x) = \cot^3 u(x)$$

$$u(x) = 3x, u'(x) = 3$$

$$f'(x) = 3[-u'(x)(1 + \cot^2 u(x))] \cot^{3-1} u(x)$$

$$f'(x) = -9(1 + \cot^2(3x)) \cot^2(3x)$$

مثال:

$$f(x) = \frac{1}{\sin^2 x}$$

$$f'(x) = \frac{-2 \sin x \cos x}{\sin^4 x}$$

$$f'(x) = -\frac{2 \cos x}{\sin^3 x}$$

مثال:

$$f(x) = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$f'(x) = \frac{2 \sin x \cos x}{\cos^4 x}$$

$$f'(x) = \frac{2 \sin x}{\cos^3 x}$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

مشتق مرتبه اول
توابع

$$f(x) = \sin^{-1} x$$

$$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$f(x) = \cos^{-1} x$$

$$f'(x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$f(x) = \sin^{-1} u(x)$$

$$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-[u(x)]^2}} u'(x)$$

$$f(x) = \cos^{-1} u(x)$$

$$f'(x) = -\frac{1}{\sqrt{1-[u(x)]^2}} u'(x)$$

مثال:

$$f(x) = \sin^{-1}(2x)$$

$$f'(x) = \frac{2}{\sqrt{1-4x^2}}$$

مثال:

$$f(x) = \cos^{-1}(3x)$$

$$f'(x) = -\frac{3}{\sqrt{1-9x^2}}$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

مشتق مرتبه اول
توابع

$$f(x) = \tan^{-1} x$$

$$f'(x) = \frac{1}{1+x^2}$$

$$f(x) = \cot^{-1} x$$

$$f'(x) = -\frac{1}{1+x^2}$$

$$f(x) = \tan^{-1} u(x)$$

$$f'(x) = \frac{1}{1+[u(x)]^2} u'(x)$$

$$f(x) = \cot^{-1} u(x)$$

$$f'(x) = -\frac{1}{1+[u(x)]^2} u'(x)$$

مثال:

$$f(x) = \tan^{-1}(2x)$$

$$f'(x) = \frac{2}{1+4x^2}$$

مثال:

$$f(x) = \cot^{-1}(3x)$$

$$f'(x) = -\frac{3}{1+9x^2}$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

مشتق مرتبه اول
توابع

$$f(x) = \log_e x = \ln x$$

$$f'(x) = \frac{1}{x}$$

$$f(x) = \log_e u(x) = \ln u(x)$$

$$f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)}$$

$$f(x) = \log_a x, a > 0, a \neq 1$$

$$f(x) = \log_a e \frac{\log_a x}{\log_a e}$$

$$f(x) = (\log_a e) \log_e x$$

$$f(x) = (\log_a e) \ln x$$

$$f'(x) = (\log_a e) \frac{1}{x}$$

$$f(x) = \log_a u(x), a > 0, a \neq 1$$

$$f(x) = \log_a e \frac{\log_a u(x)}{\log_a e}$$

$$f(x) = (\log_a e) \log_e u(x)$$

$$f(x) = (\log_a e) \ln u(x)$$

$$f'(x) = (\log_a e) \frac{u'(x)}{u(x)}$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

مشتق مرتبه اول
توابع

$$f(x) = e^x$$

$$f'(x) = e^x$$

$$f(x) = a^x$$

$$\ln f(x) = \ln a^x = x \ln a$$

$$\frac{d}{dx} \ln f(x) = \frac{d}{dx} (x \ln a)$$

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = \ln a$$

$$f'(x) = f(x) \ln a = a^x \ln a$$

$$f(x) = e^{u(x)}$$

$$f'(x) = u'(x)e^{u(x)}$$

$$f(x) = a^{u(x)}$$

$$\ln f(x) = \ln a^{u(x)} = u(x) \ln a$$

$$\frac{d}{dx} \ln f(x) = \frac{d}{dx} (u(x) \ln a)$$

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = u'(x) \ln a$$

$$f'(x) = f(x)u'(x) \ln a = u'(x)a^{u(x)} \ln a$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

مشتق مرتبه اول

توابع

مثال:

$$f(x) = (2x + 1)^x$$

$$\ln f(x) = \ln(2x + 1)^x$$

$$\ln f(x) = x \ln(2x + 1)$$

$$\frac{d}{dx} \ln f(x) = \frac{d}{dx} [x \ln(2x + 1)]$$

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = \ln(2x + 1) + \frac{2x}{2x + 1}$$

$$f'(x) = (2x + 1)^x \ln(2x + 1) + \frac{2x(2x + 1)^x}{2x + 1}$$

$$f'(x) = (2x + 1)^x \ln(2x + 1) + 2x(2x + 1)^{x-1}$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

مشتق مرتبه اول

توابع

مثال:

$$f(x) = \log_x(2x + 1)$$

تغییر پایه

$$\log_x(2x + 1) = \frac{\log_e(2x + 1)}{\log_e x} = \frac{\ln(2x + 1)}{\ln x}$$

بنابراین

$$f(x) = \frac{\ln(2x + 1)}{\ln x}$$

$$f'(x) = \frac{1}{[\ln x]^2} (2 \ln x - \ln(2x + 1))$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

مشتق مرتبه اول
توابع

مثال:

$$f(x) = e^{-ix}$$

$$u(x) = ix, u'(x) = -i$$

$$f'(x) = u'(x)e^{u(x)}$$

$$f'(x) = -ie^{-ix}$$

مثال:

$$f(x) = \frac{1}{2i}(e^{ix} - e^{-ix}) = \sin x$$

$$f'(x) = \frac{1}{2i}(ie^{ix} + ie^{-ix})$$

$$f'(x) = \frac{1}{2}(e^{ix} + e^{-ix}) = \cos x$$

مثال:

$$f(x) = e^{ix}$$

$$u(x) = ix, u'(x) = i$$

$$f'(x) = u'(x)e^{u(x)}$$

$$f'(x) = ie^{ix}$$

مثال:

$$f(x) = \frac{1}{2}(e^{ix} + e^{-ix}) = \cos x$$

$$f'(x) = \frac{1}{2}(ie^{ix} - ie^{-ix})$$

$$f'(x) = -\frac{1}{2i}(e^{ix} - e^{-ix}) = -\sin x$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

مشتق مرتبه اول
توابع

مثال:

$$f(x) = e^{-x}$$

$$f'(x) = -e^{-x}$$

مثال:

$$f(x) = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x}) = \sinh x$$

$$f'(x) = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x}) = \cosh x$$

$$f(x) = \sinh x$$

$$f'(x) = \cosh x$$

مثال:

$$f(x) = e^x$$

$$f'(x) = e^x$$

مثال:

$$f(x) = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x}) = \cosh x$$

$$f'(x) = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x}) = \sinh x$$

$$f(x) = \cosh x$$

$$f'(x) = \sinh x$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

مشتق مرتبه اول
توابع

مثال:

مثال:

$$f(x) = \frac{\sinh x}{\cosh x} = \tanh x$$

$$f(x) = \frac{\cosh x}{\sinh x} = \coth x$$

$$f'(x) = \frac{\cosh x \cosh x - \sinh x \sinh x}{[\cosh x]^2}$$

$$f'(x) = \frac{\sinh x \sinh x - \cosh x \cosh x}{[\sinh x]^2}$$

$$f'(x) = \frac{\cosh^2 x - \sinh^2 x}{\cosh^2 x}$$

$$f'(x) = \frac{\sinh^2 x - \cosh^2 x}{\sinh^2 x}$$

$$f'(x) = 1 - \tanh^2 x$$

$$f'(x) = 1 - \coth^2 x$$

$$f(x) = \tanh x$$

$$f(x) = \coth x$$

$$f'(x) = 1 - \tanh^2 x$$

$$f'(x) = 1 - \coth^2 x$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

مشتق مرتبه اول
توابع

$$f(x) = \sinh u(x)$$

$$f'(x) = u'(x) \cosh u(x)$$

$$f(x) = \cosh u(x)$$

$$f'(x) = u'(x) \sinh u(x)$$

$$f(x) = \tanh u(x)$$

$$f'(x) = u'(x)[1 - \tanh^2 u(x)]$$

$$f(x) = \coth u(x)$$

$$f'(x) = u'(x)[1 - \coth^2 u(x)]$$

مثال:

$$f(x) = \sinh^2 x$$

$$f'(x) = 2 \cosh x \sinh x$$

$$f(x) = \cosh^3(2x)$$

$$f'(x) = 6 \sinh(2x) \cosh^2(2x)$$

مثال:

$$f(x) = \tanh^2 x$$

$$f'(x) = 2(1 - \tanh^2 x) \tanh x$$

$$f(x) = \coth^3(2x)$$

$$f'(x) = 6(1 - \coth^2(2x)) \coth^2(2x)$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

مشتق مرتبه اول
توابع

$$f(x) = \sinh^{-1} x$$

$$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$$

$$f(x) = \cosh^{-1} x$$

$$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$$

$$f(x) = \tanh^{-1} x$$

$$f'(x) = \frac{1}{1-x^2}$$

$$f(x) = \coth^{-1} x$$

$$f'(x) = \frac{1}{1-x^2}$$

$$f(x) = \sinh^{-1} u(x)$$

$$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{[u(x)]^2+1}} u'(x)$$

$$f(x) = \cosh^{-1} u(x)$$

$$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{[u(x)]^2-1}} u'(x)$$

$$f(x) = \tanh^{-1} u(x)$$

$$f'(x) = \frac{1}{1-[u(x)]^2} u'(x)$$

$$f(x) = \coth^{-1} u(x)$$

$$f'(x) = \frac{1}{1-[u(x)]^2} u'(x)$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

مشتق مرتبه اول
توابع

مثال:

$$f(x) = e^{-x} \cos x$$

$$u(x) = e^{-x}, u'(x) = -e^{-x}$$

$$v(x) = \cos x, v'(x) = -\sin x$$

$$f'(x) = -e^{-x} \cos x - e^{-x} \sin x$$

مثال:

$$f(x) = \ln x \sin x$$

$$u(x) = \ln x, u'(x) = \frac{1}{x}$$

$$v(x) = \sin x, v'(x) = \cos x$$

$$f'(x) = \frac{\sin x}{x} + \ln x \cos x$$

مثال:

$$f(x) = x \sin x$$

$$u(x) = x, u'(x) = 1$$

$$v(x) = \sin x, v'(x) = \cos x$$

$$f'(x) = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$$

$$f'(x) = \sin x + x \cos x$$

مثال:

$$f(x) = x^2 e^{-x}$$

$$u(x) = x^2, u'(x) = 2x$$

$$v(x) = e^{-x}, v'(x) = -e^{-x}$$

$$f'(x) = 2xe^{-x} - x^2e^{-x}$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

مشتق مرتبه اول
دیفرانسیل

$$y = f(x)$$

$$\frac{dy}{dx} = f'(x)$$

$$dy = f'(x)dx$$

مثال:

$$y = f(x) = \sqrt{1+x^2}$$

$$f'(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$$

$$dy = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} dx$$

مثال:

$$y = f(x) = e^{-x}$$

$$f'(x) = -e^{-x}$$

$$dy = -e^{-x} dx$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

مشتق مرتبه دوم

نقطه عطف (Inflection Point)

در نقطه عطف تقعر تابع عوض می‌شود.

$$f(x) = 2 \cos x - \sqrt{2}x$$

$$-\pi \leq x \leq 3\pi/2$$

نقاط اکسترمم:


$$f'(x) = 0 : -2 \sin x - \sqrt{2} = 0$$

نقاط مینیمم:

$$x = -\frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}$$


نقطه ماکزیمم:

$$x = -\frac{\pi}{4}$$



مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

مشتق مرتبه دوم
نقطه عطف (Inflection Point)
در نقطه عطف تقعر تابع عوض می‌شود.



$$f(x) = 2 \cos x - \sqrt{2}x$$

$$-\pi \leq x \leq 3\pi/2$$


نقاط عطف:

$$f''(x) = 0 : \cos x = 0$$

$$x = -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

مشتق مرتبه دوم
نقطه عطف (Inflection Point)
در نقطه عطف تقعر تابع عوض می‌شود.



$$f(x) = 2 \cos x - \sqrt{2}x$$

$$-\pi \leq x \leq 3\pi/2$$



نقاط عطف:

$$f''(x) = 0 : \cos x = 0$$

$$x = -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

مشتق مرتبه دوم
تعیین مینیمم و ماکزیمم تابع با استفاده از مشتق دوم



مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

مشتق مرتبه دوم

تعیین مینیمم و ماکزیمم تابع با استفاده از مشتق دوم

$$f(x) = 2 \cos x - \sqrt{2}x$$

$$-\pi \leq x \leq 3\pi/2$$


نقاط مینیمم:

$$f''(x = -\frac{3\pi}{4}) = \frac{\sqrt{2}}{2} > 0$$

$$f''(x = \frac{5\pi}{4}) = \frac{\sqrt{2}}{2} > 0$$


نقطه ماکزیمم:

$$f''(x = -\frac{\pi}{4}) = -\frac{\sqrt{2}}{2} < 0$$




مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

انتگرال



مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

انتگرال



$$\Delta x = \frac{b - a}{4}$$

$$S_1 = f(a) \Delta x$$

$$S_2 = f(a + \Delta x) \Delta x$$

$$S_3 = f(a + 2\Delta x) \Delta x$$

$$S_4 = f(a + 3\Delta x) \Delta x$$


$$\text{مساحت} = S = S_1 + S_2 + S_3 + S_4$$

$$S = \sum_{i=1}^4 S_i$$

$$S = \sum_{i=1}^4 f(a + (i - 1)\Delta x) \Delta x$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

انتگرال



$$\Delta x = \frac{b - a}{8}$$

$$S_1 = f(a)\Delta x$$

$$S_2 = f(a + \Delta x)\Delta x$$

⋮

$$S_8 = f(a + 7\Delta x)\Delta x$$

$$\text{مساحت} = S = S_1 + S_2 + \cdots + S_8$$

$$S = \sum_{i=1}^8 S_i$$

$$S = \sum_{i=1}^8 f(a + (i - 1)\Delta x)\Delta x$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

انتگرال
بطور کلی

$$\forall n \in \mathbb{Z}^+ : \Delta x = \frac{b - a}{n}$$

$$S_1 = f(x_1)\Delta x = f(a)\Delta x$$

$$S_2 = f(x_2)\Delta x = f(a + \Delta x)\Delta x$$

⋮

$$S_i = f(x_i)\Delta x = f(a + (i - 1)\Delta x)\Delta x$$

⋮

$$S_n = f(x_n)\Delta x = f(a + (n - 1)\Delta x)\Delta x$$

$$\text{مساحت} = S = S_1 + S_2 + \cdots + S_i + \cdots + S_n = \sum_{i=1}^n S_i = \sum_{i=1}^n f(x_i)\Delta x$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

انتگرال
بطور کلی

$$\forall n \in \mathbb{Z}^+ : \Delta x = \frac{b-a}{n}$$

$$S = \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x$$

تعریف انتگرال

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x = \int_a^b f(x) dx$$

یا

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x = \int_a^b f(x) dx$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

انتگرال

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{\text{حد پایین انتگرالگیری}}^{\text{حد بالای انتگرالگیری}} dx \text{ انتگرالده}$$

- ◀ \int را علامت انتگرالگیری می نامند.
- ◀ a را حد پایین انتگرالگیری می نامند.
- ◀ b را حد بالای انتگرالگیری می نامند.
- ◀ x را متغیر انتگرالگیری می نامند.
- ◀ تابع $f(x)$ را انتگرالده می نامند.

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

انتگرال

انتگرال نامعین

انتگرال معین

$$\frac{dF}{dx} = f(x), \quad a \leq x \leq b$$

$$dF = f(x)dx$$

$$\int dF = \int f(x)dx$$

$$F(b) - F(a) = \int_a^b f(x)dx$$

اگر: $F(b) - F(a) = -(F(a) - F(b))$

$$\int_a^b f(x)dx = - \int_b^a f(x)dx$$

$$\frac{dF}{dx} = f(x)$$

$$dF = f(x)dx$$

$$\int dF = \int f(x)dx$$

$$F(x) = \int f(x)dx + C$$

فرم دیگری

$$F(x) = \int^x f(t)dt + C$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

انتگرال

انتگرال معین

◀ انتگرال با حد بالا و پایین یکسان برابر صفر است،

$$\int_a^a f(x) dx = 0$$

◀ اگر $c \in (a, b)$ می‌توان

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

◀ مقدار متوسط

$$\bar{f} = \langle f \rangle = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

انتگرال

انتگرال معین و نامعین
◀ k یک ثابت است،

$$\int_a^b k f(x) dx = k \int_a^b f(x) dx$$

$$\int k f(x) dx = k \int f(x) dx$$

◀ خاصیت جداسازی جمع و تفریق انتگرالده

$$\int_a^b (f(x) \pm g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx$$

$$\int (f(x) \pm g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

انتگرال توابع

$$\int c dx = cx, \quad c = \text{ثابت}$$

$$\int x^n dx = \frac{1}{n+1} x^{n+1}, \quad n \neq -1$$

مثال:

$$\int (x - 2) dx = \int x dx - 2 \int dx = \frac{1}{2} x^2 - 2x$$

مثال:

$$\int (x^2 + 1) dx = \int x^2 dx + \int dx = \frac{1}{3} x^3 + x$$

مثال:

$$\int (2x + 1)^2 dx = 4 \int x^2 dx + 4 \int x dx + \int dx = \frac{4}{3} x^3 + 2x^2 + x$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

انتگرال توابع
مثال:

$$\int (x+1)^4 dx, \quad \text{تغییر متغیر: } x+1 = u, \quad dx = du$$

$$\int (x+1)^4 dx = \int u^4 du = \frac{1}{5}u^5 = \frac{1}{5}(x+1)^5$$

مثال:

$$\int \sqrt{x} dx = \int x^{\frac{1}{2}} dx = \frac{1}{1 + \frac{1}{2}} x^{1 + \frac{1}{2}} = \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} = \frac{2}{3} \sqrt{x^3}$$

مثال:

$$\int \sqrt{2x+1} dx, \quad \text{تغییر متغیر: } 2x+1 = u, \quad 2dx = du$$

$$\int \sqrt{2x+1} dx = \int u^{\frac{1}{2}} \frac{du}{2} = \frac{1}{2} \int u^{\frac{1}{2}} du = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{\frac{3}{2}} u^{\frac{3}{2}} = \frac{1}{3} \sqrt{(2x+1)^3}$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

انتگرال توابع
مثال:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{2x+1}}, \quad \text{تغییر متغیر: } 2x+1 = u, \quad 2dx = du$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{2x+1}} = \frac{1}{2} \int u^{-\frac{1}{2}} du = \frac{1}{2} \frac{1}{1-\frac{1}{2}} u^{1-\frac{1}{2}} = (2x+1)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{2x+1}$$

مثال:

$$\int \frac{x dx}{\sqrt{x^2-1}}, \quad \text{تغییر متغیر: } x^2-1 = u, \quad 2x dx = du$$

$$\int \frac{x dx}{\sqrt{x^2-1}} = \frac{1}{2} \int u^{-\frac{1}{2}} du = \frac{1}{2} \frac{1}{1-\frac{1}{2}} u^{1-\frac{1}{2}} = (x^2-1)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{x^2-1}$$

مثال:

$$\int (x^3+x)^5 (3x^2+1) dx, \quad \text{تغییر متغیر: } x^3+x = u, \quad (3x^2+1) dx = du$$

$$\int (x^3+x)^5 (3x^2+1) dx = \int u^5 du = \frac{1}{6} u^6 = \frac{1}{6} (x^3+x)^6$$

$$\int \frac{dx}{x} = \ln x$$

مثال:

$$\int \frac{dx}{2x-1}, \quad \text{تغییر متغیر: } 2x-1 = u, \quad 2dx = du$$

$$\int \frac{dx}{2x-1} = \frac{1}{2} \int \frac{du}{u} = \frac{1}{2} \ln u = \frac{1}{2} \ln(2x-1)$$

مثال:

$$\int \frac{x dx}{x^2+1}, \quad \text{تغییر متغیر: } x^2+1 = u, \quad 2x dx = du$$

$$\int \frac{x dx}{x^2+1} = \frac{1}{2} \int \frac{du}{u} = \frac{1}{2} \ln u = \frac{1}{2} \ln(x^2+1)$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

انتگرال توابع
مثال:

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{x^2 - 5x + 6} &= \int \frac{dx}{(x-3)(x-2)} = \int \left(\frac{1}{x-3} - \frac{1}{x-2} \right) dx \\ &= \int \frac{dx}{x-3} - \int \frac{dx}{x-2} = \ln(x-3) - \ln(x-2) = \ln \left(\frac{x-3}{x-2} \right)\end{aligned}$$

مثال:

$$\begin{aligned}\int \frac{x dx}{x+3} &= \int \frac{x+3-3}{x+3} dx = \int \left(1 - \frac{3}{x+3} \right) dx \\ &= \int dx - 3 \int \frac{dx}{x+3} = x - 3 \ln(x+3)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\int \frac{x^2 dx}{x+3} &= \int \frac{x^2 - 9 + 9}{x+3} dx = \int \left(\frac{(x+3)(x-3)}{x+3} + \frac{9}{x+3} \right) dx \\ &= \int (x-3) dx + 9 \int \frac{dx}{x+3} = \frac{1}{2}x^2 - 3x + 9 \ln(x+3)\end{aligned}$$

مثال:

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{x(x-1)} &= \int \left(-\frac{1}{x} + \frac{1}{x-1} \right) dx \\ &= -\int \frac{dx}{x} + \int \frac{dx}{x-1} = -\ln x + \ln(x-1) = \ln \left(\frac{x-1}{x} \right)\end{aligned}$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

انتگرال توابع

$$\int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \int \frac{1}{(x - a)(x + a)} dx = \frac{1}{2a} \int \left(\frac{1}{x - a} - \frac{1}{x + a} \right) dx$$

$$\int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \int \frac{dx}{x - a} - \frac{1}{2a} \int \frac{dx}{x + a} = \frac{1}{2a} \ln(x - a) - \frac{1}{2a} \ln(x + a)$$

$$\boxed{\int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left(\frac{x - a}{x + a} \right)}$$

$$\int \frac{dx}{a^2 - x^2} = \int \frac{1}{(a + x)(a - x)} dx = \frac{1}{2a} \int \left(\frac{1}{a + x} + \frac{1}{a - x} \right) dx$$

$$\int \frac{dx}{a^2 - x^2} = \frac{1}{2a} \int \frac{dx}{a + x} + \frac{1}{2a} \int \frac{dx}{a - x} = \frac{1}{2a} \ln(a + x) - \frac{1}{2a} \ln(a - x)$$

$$\boxed{\int \frac{dx}{a^2 - x^2} = \frac{1}{2a} \ln \left(\frac{a + x}{a - x} \right)}$$

$$\int e^{ax} dx = \frac{1}{a} e^{ax}$$

مثال:

$$\int x e^{ax} dx$$

$$d(xe^{ax}) = e^{ax} dx + axe^{ax} dx$$

$$\int d(xe^{ax}) - \int e^{ax} dx = a \int x e^{ax} dx$$

$$\int x e^{ax} dx = \frac{1}{a} \int d(xe^{ax}) - \frac{1}{a} \int e^{ax} dx$$

$$\int x e^{ax} dx = \frac{1}{a} x e^{ax} - \frac{1}{a^2} e^{ax} = \left(\frac{x}{a} - \frac{1}{a^2} \right) e^{ax}$$

$$\int x^2 e^{ax} dx$$

$$d(x^2 e^{ax}) = 2x e^{ax} dx + ax^2 e^{ax} dx$$

$$\int d(x^2 e^{ax}) - 2 \int x e^{ax} dx = a \int x^2 e^{ax} dx$$

$$\int x^2 e^{ax} dx = \frac{1}{a} \int d(x^2 e^{ax}) - \frac{2}{a} \int x e^{ax} dx$$

$$\text{مثال قبل : } \int x e^{ax} dx = \left(\frac{x}{a} - \frac{1}{a^2} \right) e^{ax}$$

$$\int x^2 e^{ax} dx = \frac{1}{a} x^2 e^{ax} - \frac{2}{a} \left(\frac{x}{a} - \frac{1}{a^2} \right) e^{ax} = \left(\frac{x^2}{a} - \frac{2x}{a^2} + \frac{2}{a^3} \right) e^{ax}$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

انتگرال

مشتق انتگرال

$$x \quad e^{ax}$$

$$1 \quad \frac{1}{a}e^{ax}$$

$$0 \quad \frac{1}{a^2}e^{ax}$$

$$\int xe^{ax} dx$$

روش جدول

مشتق انتگرال

$$x \quad + \quad e^{ax}$$

$$1 \quad - \quad \frac{1}{a}e^{ax}$$

$$0 \quad \frac{1}{a^2}e^{ax}$$

$$\int xe^{ax} dx = \left(+\frac{x}{a}e^{ax} \right) + \left(-\frac{1}{a^2}e^{ax} \right)$$

$$\int xe^{ax} dx = \left(\frac{x}{a} - \frac{1}{a^2} \right) e^{ax}$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

انتگرال

مشتق انتگرال

$$x^2 \quad e^{ax}$$

$$2x \quad \frac{1}{a}e^{ax}$$

$$2 \quad \frac{1}{a^2}e^{ax}$$

$$0 \quad \frac{1}{a^3}e^{ax}$$

مشتق انتگرال

$$x^2 \quad + \quad e^{ax}$$

$$2x \quad - \quad \frac{1}{a}e^{ax}$$

$$2 \quad + \quad \frac{1}{a^2}e^{ax}$$

$$0 \quad + \quad \frac{1}{a^3}e^{ax}$$

$$\int x^2 e^{ax} dx$$

روش جدول

$$\int x^2 e^{ax} dx = \left(+ \frac{x^2}{a} e^{ax} \right)$$

$$+ \left(- \frac{2x}{a^2} e^{ax} \right)$$

$$+ \left(+ \frac{2}{a^3} e^{ax} \right)$$

$$\int x e^{ax} dx = \left(\frac{x^2}{a} - \frac{2x}{a^2} + \frac{2}{a^3} \right) e^{ax}$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

انتگرال توابع
مثال:

$$\int a^x dx, \quad \text{تغییر متغیر: } a^x = u \Rightarrow x \ln a = \ln u, \quad (\ln a) dx = \frac{du}{u}$$

$$\int a^x dx = \frac{1}{\ln a} \int u \frac{du}{u} = \frac{1}{\ln a} u = \frac{a^x}{\ln a}$$

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a}, \quad a > 0, a \neq 1$$

مثال:

$$\int \ln x dx, \quad \text{تغییر متغیر: } \ln x = u \Rightarrow x = e^u, \quad dx = e^u du$$

$$\int \ln x dx = \int u e^u du = (u - 1) e^u = (\ln x - 1) e^{\ln x} = x(\ln x - 1)$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

انتگرال توابع
مثال:

$$\int \frac{\ln x}{x} dx, \quad \text{تغییر متغیر: } \ln x = u \Rightarrow x = e^u, \quad dx = e^u du$$

$$\int \frac{\ln x}{x} dx = \int \frac{u}{e^u} e^u du = \int u du = \frac{1}{2} u^2 = \frac{1}{2} (\ln x)^2$$

مثال:

$$\int x \ln x dx, \quad \text{تغییر متغیر: } \ln x = u \Rightarrow x = e^u, \quad dx = e^u du$$

$$\begin{aligned} \int x \ln x dx &= \int u e^{2u} du = \left(\frac{u}{2} - \frac{1}{4} \right) e^{2u} \\ &= \left(\frac{1}{2} \ln x - \frac{1}{4} \right) e^{2 \ln x} = x^2 \left(\frac{1}{2} \ln x - \frac{1}{4} \right) \end{aligned}$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

انتگرال توابع
مثال:

$$\int xa^x dx, \quad \text{تغییر متغیر: } a^x = e^u \Rightarrow x \ln a = e^u du, \quad dx = \frac{1}{\ln a} e^u du$$

$$\int xa^x dx = \frac{1}{(\ln a)^2} \int ue^u du = \frac{1}{(\ln a)^2} (u - 1)e^u = \frac{1}{(\ln a)^2} (x \ln a - 1)a^x$$

روش جدول

مشق	انتگرال
x	a^x
1	$\frac{1}{\ln a} a^x$
0	$\frac{1}{(\ln a)^2} a^x$

$$\int xa^x dx = \left(+ \frac{x}{\ln a} a^x \right) + \left(- \frac{1}{(\ln a)^2} a^x \right)$$

$$\int xa^x dx = \frac{1}{(\ln a)^2} (x \ln a - 1)a^x$$

$$\sin ax = \frac{e^{iax} - e^{-iax}}{2i}$$

$$\int \sin ax dx = \frac{1}{2i} \left(\int e^{iax} dx - \int e^{-iax} dx \right) = \frac{1}{2i} \left(\frac{1}{ia} e^{iax} + \frac{1}{ia} e^{-iax} \right)$$

$$\int \sin ax dx = -\frac{1}{a} \cos ax$$

$$\cos ax = \frac{e^{iax} + e^{-iax}}{2}$$

$$\int \cos ax dx = \frac{1}{2} \left(\int e^{iax} dx + \int e^{-iax} dx \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{ia} e^{iax} - \frac{1}{ia} e^{-iax} \right)$$

$$\int \cos ax dx = \frac{1}{a} \sin ax$$

$$\tan ax = \frac{\sin ax}{\cos ax}$$

$$\int \tan ax dx = \int \frac{\sin ax}{\cos ax} dx = -\frac{1}{a} \int \frac{(-a \sin ax)}{\cos ax} dx = -\frac{1}{a} \ln \cos ax$$

$$\int \tan ax dx = -\frac{1}{a} \ln \cos ax$$

$$\cot ax = \frac{\cos ax}{\sin ax}$$

$$\int \cot ax dx = \int \frac{\cos ax}{\sin ax} dx = \frac{1}{a} \int \frac{a \cos ax}{\sin ax} dx = \frac{1}{a} \ln \sin ax$$

$$\int \cot ax dx = \frac{1}{a} \ln \sin ax$$

$$\sinh ax = \frac{e^{ax} - e^{-ax}}{2}$$

$$\int \sinh ax dx = \frac{1}{2} \left(\int e^{ax} dx - \int e^{-ax} dx \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{a} e^{ax} + \frac{1}{a} e^{-ax} \right)$$

$$\int \sinh ax dx = \frac{1}{a} \cosh ax$$

$$\cosh ax = \frac{e^{ax} + e^{-ax}}{2}$$

$$\int \cosh ax dx = \frac{1}{2} \left(\int e^{ax} dx + \int e^{-ax} dx \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{a} e^{ax} - \frac{1}{a} e^{-ax} \right)$$

$$\int \cosh ax dx = \frac{1}{a} \sinh ax$$

$$\tanh ax = \frac{\sinh ax}{\cosh ax}$$

$$\int \tanh ax dx = \int \frac{\sinh ax}{\cosh ax} dx = \frac{1}{a} \int \frac{(a \sinh ax)}{\cosh ax} dx = \frac{1}{a} \ln \cosh ax$$

$$\int \tanh ax dx = \frac{1}{a} \ln \cosh ax$$

$$\coth ax = \frac{\cosh ax}{\sinh ax}$$

$$\int \coth ax dx = \int \frac{\cosh ax}{\sinh ax} dx = \frac{1}{a} \int \frac{a \cosh ax}{\sinh ax} dx = \frac{1}{a} \ln \sinh ax$$

$$\int \coth ax dx = \frac{1}{a} \ln \sinh ax$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

انتگرال توابع
مثال:

$$\int \sin x \cos x dx, \quad \cos x = u, \quad -\sin x dx = du$$

$$\int \sin x \cos x dx = -\int u du = -\frac{1}{2}u^2 = -\frac{1}{2}\cos^2 x$$

مثال:

$$\int \sin x \cos x dx, \quad \sin x = u, \quad \cos x dx = du$$

$$\int \sin x \cos x dx = \int u du = \frac{1}{2}u^2 = \frac{1}{2}\sin^2 x$$

مثال:

$$\int \sin x \cos x dx = \frac{1}{2} \int \sin 2x dx = -\frac{1}{4} \cos 2x = -\frac{1}{2} \cos^2 x + \frac{1}{4} = -\frac{1}{4} + \frac{1}{2} \sin^2$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

انتگرال توابع
مثال:

$$\int \sin^2 x dx, \quad \cos 2x = 1 - 2 \sin^2 x, \quad \sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$$

$$\int \sin^2 x dx = \frac{1}{2} \int (1 - \cos 2x) dx = \frac{1}{2} \left[x - \frac{1}{2} \sin 2x \right]$$

مثال:

$$\int \cos^2 x dx, \quad \cos 2x = 2 \cos^2 x - 1, \quad \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$$

$$\int \cos^2 x dx = \frac{1}{2} \int (1 + \cos 2x) dx = \frac{1}{2} \left[x + \frac{1}{2} \sin 2x \right]$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

انتگرال توابع
مثال:

$$\int \sin^3 x dx, \quad \sin^3 x = \sin x \sin^2 x = \sin x(1 - \cos^2 x) = \sin x - \sin x \cos^2 x$$

$$\int \sin^3 x dx = \int (\sin x - \sin x \cos^2 x) dx = -\cos x + \frac{1}{3} \cos^3 x$$

مثال:

$$\int \cos^3 x dx, \quad \cos^3 x = \cos x \cos^2 x = \cos x(1 - \sin^2 x) = \cos x - \cos x \sin^2 x$$

$$\int \cos^3 x dx = \int (\cos x - \cos x \sin^2 x) dx = \sin x - \frac{1}{3} \sin^3 x$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

انتگرال توابع
مثال:

مشتق	انتگرال
x	$+$ $\sin x$
1	$-$ $\cos x$
0	$-$ $\sin x$

$$\int x \sin x dx = (-x \cos x) - (-\sin x)$$

$$\int x \sin x dx = -x \cos x + \sin x$$

مثال:

مشتق	انتگرال
x^2	$+$ $\cos x$
$2x$	$-$ $\sin x$
2	$+$ $-\cos x$
0	$-$ $\sin x$

$$\int x^2 \cos x dx = (x^2 \sin x) - (-2x \cos x) + (-2 \sin x)$$

$$\int x^2 \cos x dx = x^2 \sin x + 2x \cos x - 2 \sin x$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}}, \quad \text{تغییر متغیر: } x = a \sin u \Rightarrow dx = a \cos u du$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \int \frac{a \cos u du}{a \cos u} = \int du = u = \sin^{-1} \left(\frac{x}{a} \right)$$

$$\boxed{\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \sin^{-1} \left(\frac{x}{a} \right)}$$

$$\int \frac{dx}{a^2 + x^2}, \quad \text{تغییر متغیر: } x = a \tan u \Rightarrow dx = a(1 + \tan^2 u) du$$

$$\int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \int \frac{a(1 + \tan^2 u) du}{a^2(1 + \tan^2 u)} = \frac{1}{a} \int du = \frac{1}{a} u = \frac{1}{a} \tan^{-1} \left(\frac{x}{a} \right)$$

$$\boxed{\int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1} \left(\frac{x}{a} \right)}$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

انتگرال توابع

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 + x^2}}, \quad \text{تغییر متغیر: } x = a \sinh u \Rightarrow dx = a \cosh u du$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} = \int \frac{a \cosh u du}{a \cosh u} = \int du = u = \sinh^{-1} \left(\frac{x}{a} \right)$$

$$\boxed{\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} = \sinh^{-1} \left(\frac{x}{a} \right)}$$

$$\int \frac{dx}{a^2 - x^2}, \quad \text{تغییر متغیر: } x = a \tanh u \Rightarrow dx = a(1 - \tanh^2 u) du$$

$$\int \frac{dx}{a^2 - x^2} = \int \frac{a(1 - \tanh^2 u) du}{a^2(1 - \tanh^2 u)} = \frac{1}{a} \int du = \frac{1}{a} u = \frac{1}{a} \tanh^{-1} \left(\frac{x}{a} \right)$$

$$\boxed{\int \frac{dx}{a^2 - x^2} = \frac{1}{a} \tanh^{-1} \left(\frac{x}{a} \right) = \frac{1}{2a} \ln \left(\frac{a+x}{a-x} \right), \quad x^2 < a^2}$$

$$\int \frac{dx}{x^2 - a^2}, \quad \text{تغییر متغیر: } x = a \coth u \Rightarrow dx = a(1 - \coth u)du$$

$$\int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \int \frac{a(1 - \coth^2 u)du}{a^2(\coth^2 u - 1)} = -\frac{1}{a} \int du = -\frac{1}{a}u = -\frac{1}{a} \coth^{-1} \left(\frac{x}{a} \right)$$

$$\int \frac{dx}{x^2 - a^2} = -\frac{1}{a} \coth^{-1} \left(\frac{x}{a} \right) = \frac{1}{2a} \ln \left(\frac{x - a}{x + a} \right), \quad x^2 > a^2$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

انتگرال توابع
مثال:

$$\int \frac{dx}{\cos x} = \int \frac{1}{\cos x} \frac{\frac{1}{\cos x} + \tan x}{\frac{1}{\cos x} + \tan x} dx = \int \frac{1 + \sin x}{\frac{\cos^2 x}{1 + \sin x}} dx$$

$$\frac{1 + \sin x}{\cos x} = u \Rightarrow \frac{1 + \sin x}{\cos^2 x} dx = du$$

$$\int \frac{dx}{\cos x} = \int \frac{1 + \sin x}{\frac{\cos^2 x}{1 + \sin x}} dx = \int \frac{du}{u} = \ln u = \ln \left(\frac{1}{\cos x} + \tan x \right)$$

$$\int \frac{dx}{\cos x} = \ln \left(\frac{1}{\cos x} + \tan x \right) = \ln (\sec x + \tan x)$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

انتگرال توابع
مثال:

$$\int \frac{dx}{\sin x} = \int \frac{1}{\sin x} \frac{\frac{1}{\sin x} - \cot x}{\frac{1}{\sin x} - \cot x} dx = \int \frac{\frac{1-\cos x}{\sin^2 x}}{\frac{1-\cos x}{\sin x}} dx$$

$$\frac{1-\cos x}{\sin x} = u \Rightarrow \frac{1-\cos x}{\sin^2 x} dx = du$$

$$\int \frac{dx}{\sin x} = \int \frac{\frac{1-\cos x}{\sin^2 x}}{\frac{1-\cos x}{\sin x}} dx = \int \frac{du}{u} = \ln u = \ln \left(\frac{1}{\sin x} - \cot x \right)$$

$$\int \frac{dx}{\sin x} = \ln \left(\frac{1}{\sin x} - \cot x \right) = \ln (\csc x - \cot x)$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

انتگرال توابع
مثال:

$$\int e^{\alpha x} \cos \beta x dx$$

با استفاده از فرمول اولر

$$e^{i\beta x} = \cos \beta x + i \sin \beta x$$

می توان

$$\mathcal{R} \left[\int e^{\alpha x} e^{i\beta x} dx \right] = \int e^{\alpha x} \cos \beta x dx$$

$$\mathcal{I} \left[\int e^{\alpha x} e^{i\beta x} dx \right] = \int e^{\alpha x} \sin \beta x dx$$

با این شرایط بررسی انتگرال زیر را در دستور کار قرار می دهیم

$$\int e^{\alpha x} e^{i\beta x} dx = \int e^{(\alpha+i\beta)x} dx = \frac{1}{\alpha + i\beta} e^{(\alpha+i\beta)x}$$

$$\int e^{\alpha x} e^{i\beta x} dx = \frac{1}{\alpha + i\beta} e^{(\alpha + i\beta)x}$$

$$\frac{1}{\alpha + i\beta} e^{(\alpha + i\beta)x} = \frac{1}{\alpha + i\beta} e^{\alpha x} e^{i\beta x} = \frac{1}{\alpha + i\beta} e^{\alpha x} [\cos \beta x + i \sin \beta x]$$

$$\frac{1}{\alpha + i\beta} e^{(\alpha + i\beta)x} = \frac{\alpha - i\beta}{(\alpha + i\beta)(\alpha - i\beta)} e^{\alpha x} [\cos \beta x + i \sin \beta x]$$

$$\frac{1}{\alpha + i\beta} e^{(\alpha + i\beta)x} = \frac{e^{\alpha x}}{(\alpha^2 + \beta^2)} [(\alpha - i\beta)(\cos \beta x + i \sin \beta x)]$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{\alpha + i\beta} e^{(\alpha + i\beta)x} &= \frac{e^{\alpha x}}{(\alpha^2 + \beta^2)} (\alpha \cos \beta x + \beta \sin \beta x) \\ &+ i \frac{e^{\alpha x}}{(\alpha^2 + \beta^2)} (-\beta \cos \beta x + \alpha \sin \beta x) \end{aligned}$$

$$\int e^{\alpha x} e^{i\beta x} dx = \frac{1}{\alpha + i\beta} e^{(\alpha + i\beta)x}$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{\alpha + i\beta} e^{(\alpha + i\beta)x} &= \frac{e^{\alpha x}}{(\alpha^2 + \beta^2)} (\alpha \cos \beta x + \beta \sin \beta x) \\ &+ i \frac{e^{\alpha x}}{(\alpha^2 + \beta^2)} (-\beta \cos \beta x + \alpha \sin \beta x) \end{aligned}$$

$$\mathcal{R} \left[\int e^{\alpha x} e^{i\beta x} dx \right] = \int e^{\alpha x} \cos \beta x dx = \frac{e^{\alpha x}}{(\alpha^2 + \beta^2)} (\alpha \cos \beta x + \beta \sin \beta x)$$

$$\mathcal{I} \left[\int e^{\alpha x} e^{i\beta x} dx \right] = \int e^{\alpha x} \sin \beta x dx = \frac{e^{\alpha x}}{(\alpha^2 + \beta^2)} (-\beta \cos \beta x + \alpha \sin \beta x)$$

$$\int e^{\alpha x} \cos \beta x dx = \frac{e^{\alpha x}}{(\alpha^2 + \beta^2)} (\alpha \cos \beta x + \beta \sin \beta x)$$

$$= \frac{e^{\alpha x}}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}} \left[\frac{\alpha}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}} \cos \beta x + \frac{\beta}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}} \sin \beta x \right]$$

اگر

$$\cos \phi = \frac{\alpha}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}}, \quad \sin \phi = \frac{\beta}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}}$$

$$\int e^{\alpha x} \cos \beta x dx = \frac{e^{\alpha x}}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}} \left[\frac{\alpha}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}} \cos \beta x + \frac{\beta}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}} \sin \beta x \right]$$

$$= \frac{e^{\alpha x}}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}} (\cos \phi \cos \beta x + \sin \phi \sin \beta x)$$

$$\int e^{\alpha x} \cos \beta x dx = \frac{e^{\alpha x}}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}} (\cos \phi \cos \beta x + \sin \phi \sin \beta x)$$

اگر

$$\cos \phi = \frac{\alpha}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}}, \quad \sin \phi = \frac{\beta}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}}$$

$$\int e^{\alpha x} \cos \beta x dx = \frac{1}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}} e^{\alpha x} \cos(\beta x - \phi)$$

$$\tan \phi = \frac{\beta}{\alpha} \Rightarrow \phi = \tan^{-1} \left(\frac{\beta}{\alpha} \right)$$

$$\begin{aligned} \int e^{\alpha x} \sin \beta x dx &= \frac{e^{\alpha x}}{(\alpha^2 + \beta^2)} (-\beta \cos \beta x + \alpha \sin \beta x) \\ &= \frac{e^{\alpha x}}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}} \left(-\frac{\beta}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}} \cos \beta x + \frac{\alpha}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}} \sin \beta x \right) \end{aligned}$$

اگر

$$\cos \phi = \frac{\alpha}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}}, \quad \sin \phi = \frac{\beta}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}}$$

$$\begin{aligned} \int e^{\alpha x} \sin \beta x dx &= \frac{e^{\alpha x}}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}} \left(-\frac{\beta}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}} \cos \beta x + \frac{\alpha}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}} \sin \beta x \right) \\ &= \frac{e^{\alpha x}}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}} (-\sin \phi \cos \beta x + \cos \phi \sin \beta x) \end{aligned}$$

$$\int e^{\alpha x} \sin \beta x dx = \frac{e^{\alpha x}}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}} (-\sin \phi \cos \beta x + \cos \phi \sin \beta x)$$

اگر

$$\cos \phi = \frac{\alpha}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}}, \quad \sin \phi = \frac{\beta}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}}$$

$$\int e^{\alpha x} \sin \beta x dx = \frac{1}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}} e^{\alpha x} \sin(\beta x - \phi)$$

$$\tan \phi = \frac{\beta}{\alpha} \Rightarrow \phi = \tan^{-1} \left(\frac{\beta}{\alpha} \right)$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

انتگرال توابع
مثال:

$$\int_0^{2\pi} \sin mx \sin nx dx$$

اگر $m \neq n$

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \beta \sin \alpha$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \beta \sin \alpha$$

از تفریق دو طرف تساوی عبارتهای بالا داریم

$$\frac{1}{2}(\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)) = \sin \alpha \sin \beta$$

بدین ترتیب

$$\int_0^{2\pi} \sin mx \sin nx dx = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \cos(m - n)x dx - \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \cos(m + n)x dx$$

$$\int_0^{2\pi} \sin mx \sin nx dx = \frac{1}{2} \left[\frac{\sin(m - n)x}{m - n} \right]_0^{2\pi} - \frac{1}{2} \left[\frac{\sin(m + n)x}{m + n} \right]_0^{2\pi} = 0$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

انتگرال توابع
مثال:

$$\int_0^{2\pi} \sin mx \sin nx dx$$

اگر $m = n$

$$\int_0^{2\pi} \sin^2 mx dx = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (1 - \cos 2mx) dx = \frac{1}{2} \left[x - \frac{1}{2m} \sin 2mx \right]_0^{2\pi}$$

$$\int_0^{2\pi} \sin^2 mx dx = \frac{1}{2} \left[x - \frac{1}{2m} \sin 2mx \right]_0^{2\pi} = \pi$$

$$\int_0^{2\pi} \sin mx \sin nx dx = \pi \delta_{mn} = \begin{cases} \pi & m = n \\ 0 & m \neq n \end{cases}$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

انتگرال توابع
مثال:

$$\int_0^{2\pi} \cos mx \cos nx dx$$

اگر $m \neq n$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \beta \sin \alpha$$

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \beta \sin \alpha$$

از جمع دو طرف تساوی عبارتهای بالا داریم

$$\frac{1}{2}(\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)) = \cos \alpha \cos \beta$$

بدین ترتیب

$$\int_0^{2\pi} \cos mx \cos nx dx = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \cos(m+n)x dx + \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \cos(m-n)x dx$$

$$\int_0^{2\pi} \cos mx \cos nx dx = \frac{1}{2} \left[\frac{\sin(m+n)x}{m+n} \right]_0^{2\pi} + \frac{1}{2} \left[\frac{\sin(m-n)x}{m-n} \right]_0^{2\pi} = 0$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

انتگرال توابع
مثال:

$$\int_0^{2\pi} \cos mx \cos nx dx$$

اگر $m = n$

$$\int_0^{2\pi} \cos^2 mx dx = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (1 + \cos 2mx) dx = \frac{1}{2} \left[x + \frac{1}{2m} \sin 2mx \right]_0^{2\pi}$$

$$\int_0^{2\pi} \cos^2 mx dx = \frac{1}{2} \left[x + \frac{1}{2m} \sin 2mx \right]_0^{2\pi} = \pi$$

$$\int_0^{2\pi} \cos mx \cos nx dx = \pi \delta_{mn} = \begin{cases} \pi & m = n \\ 0 & m \neq n \end{cases}$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

انتگرال توابع
مثال:

$$\int_0^{2\pi} \sin mx \cos nx dx$$

اگر $m \neq n$

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \sin \beta \cos \alpha$$

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \sin \beta \cos \alpha$$

از جمع دو طرف تساوی عبارتهای بالا داریم

$$\frac{1}{2}(\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)) = \sin \alpha \cos \beta$$

بدین ترتیب

$$\int_0^{2\pi} \sin mx \cos nx dx = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \sin(m+n)x dx + \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \sin(m-n)x dx$$

$$\int_0^{2\pi} \cos mx \cos nx dx = \frac{1}{2} \left[-\frac{\cos(m+n)x}{m+n} \right]_0^{2\pi} + \frac{1}{2} \left[-\frac{\cos(m-n)x}{m-n} \right]_0^{2\pi} = 0$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

انتگرال توابع
مثال:

$$\int_0^{2\pi} \sin mx \cos nx dx$$

اگر $m = n$

$$\int_0^{2\pi} \cos mx \sin mx dx = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \sin 2mx dx = \frac{1}{2} \left[-\frac{1}{2m} \cos 2mx \right]_0^{2\pi} = 0$$

$$\int_0^{2\pi} \sin mx \cos nx dx = 0 = \begin{cases} 0 & m = n \\ 0 & m \neq n \end{cases}$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

بسط تیلور (Taylor Expansion)

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f^{(1)}(x_0)}{1!}(x - x_0) + \frac{f^{(2)}(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 \\ + \dots + \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k + \dots$$

$$f^{(k)}(x_0) = \left(\frac{d^k f(x)}{dx^k} \right)_{x_0}$$

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

بسط تیلور (Taylor Expansion)

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k, \quad f^{(k)}(x_0) = \left(\frac{d^k f(x)}{dx^k} \right)_{x_0}$$

مثال:

$$f(x) = \sqrt{x}, \quad x_0 = 2$$


$$f^{(0)}(2) = \sqrt{2}, \quad f^{(1)}(2) = \frac{1}{2\sqrt{2}}, \quad f^{(2)}(2) = -\frac{1}{8\sqrt{2}}, \quad f^{(3)}(2) = +\frac{3}{32\sqrt{2}},$$

$$f(x) = \sqrt{2} + \frac{1}{2\sqrt{2}}(x - 2) - \frac{1}{16\sqrt{2}}(x - 2)^2 + \frac{1}{64\sqrt{2}}(x - 2)^3 + \dots$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

بسط تیلور (Taylor Expansion)


$$f(x) = \sqrt{2} + \frac{1}{2\sqrt{2}}(x - 2) - \frac{1}{16\sqrt{2}}(x - 2)^2$$



مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

بسط تیلور (Taylor Expansion)

$$f(x) = \sqrt{2} + \frac{1}{2\sqrt{2}}(x-2) - \frac{1}{16\sqrt{2}}(x-2)^2 + \frac{1}{64\sqrt{2}}(x-2)^3 + \dots$$



مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

بسط تیلور (Taylor Expansion)

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k, \quad f^{(k)}(x_0) = \left(\frac{d^k f(x)}{dx^k} \right)_{x_0}$$

مثال:

$$f(x) = \sin x, \quad x_0 = \pi/2$$


$$f^{(0)}(\pi/2) = 1, \quad f^{(1)}(\pi/2) = 0, \quad f^{(2)}(\pi/2) = -1, \quad f^{(3)}(\pi/2) = 0, \quad \dots$$

$$f(x) = 1 - \frac{1}{6}(x - \pi/2)^2 + \frac{1}{120}(x - \pi/2)^4 + \dots$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

بسط تیلور (Taylor Expansion)


$$f(x) = 1 - \frac{1}{6}(x - \pi/2)^2$$



مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

بسط تیلور (Taylor Expansion)

$$f(x) = 1 - \frac{1}{6}(x - \pi/2)^2 + \frac{1}{120}(x - \pi/2)^4 + \dots$$



مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

بسط تیلور (Taylor Expansion)

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k, \quad f^{(k)}(x_0) = \left(\frac{d^k f(x)}{dx^k} \right)_{x_0}$$

مثال (پتانسیل لئارد-جونز):

$$f(x) = \frac{1}{x^{12}} - \frac{1}{x^6}, \quad x_0 = \sqrt[6]{2}$$

$$f^{(1)}(x_0) = 0 \Rightarrow -\frac{12}{x_0^{13}} + \frac{6}{x_0^7} = 0 \Rightarrow x_0 = \sqrt[6]{2}$$


$$f^{(0)}(\sqrt[6]{2}) = \frac{1}{\sqrt[6]{2^{12}}} - \frac{1}{\sqrt[6]{2^6}}, \quad f^{(1)}(\sqrt[6]{2}) = -\frac{12}{\sqrt[6]{2^{13}}} + \frac{6}{\sqrt[6]{2^7}}$$

$$f^{(2)}(\sqrt[6]{2}) = \frac{12 \times 13}{\sqrt[6]{2^{14}}} - \frac{6 \times 7}{\sqrt[6]{2^8}}, \quad f^{(3)}(\sqrt[6]{2}) = \frac{12 \times 13 \times 14}{\sqrt[6]{2^{15}}} - \frac{6 \times 7 \times 8}{\sqrt[6]{2^9}}$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

بسط تیلور (Taylor Expansion)


$$f(x) = f(\sqrt[6]{2}) + \frac{f^{(1)}(\sqrt[6]{2})}{1!}(x - \sqrt[6]{2}) + \frac{f^{(2)}(\sqrt[6]{2})}{2!}(x - \sqrt[6]{2})^2$$



مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

بسط تیلور (Taylor Expansion)

$$f(x) = f(\sqrt[6]{2}) + \frac{f^{(1)}(\sqrt[6]{2})}{1!} (x - \sqrt[6]{2}) + \frac{f^{(2)}(\sqrt[6]{2})}{2!} (x - \sqrt[6]{2})^2 + \frac{f^{(3)}(\sqrt[6]{2})}{3!} (x - \sqrt[6]{2})^3$$



مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

بسط مکلورن (Maclaurin Expansion)
بسط تیلور حول نقطه صفر ($x_0 = 0$) را بسط مکلورن می‌نامند.

$$f(x) = f(0) + \frac{f^{(1)}(0)}{1!}x + \frac{f^{(2)}(0)}{2!}x^2 \\ + \dots + \frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k + \dots$$

$$f^{(k)}(0) = \left(\frac{d^k f(x)}{dx^k} \right)_{x=0}$$

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

بسط مکلاورن (Maclaurin Expansion)
بسط تیلور حول نقطه صفر ($x_0 = 0$) را بسط مکلاورن می‌نامند.

$$f(x) = f(0) + \frac{f^{(1)}(0)}{1!}x + \frac{f^{(2)}(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k + \dots$$

سریهای دو جمله‌ای (Binomial Series)

$$(1 + x)^m = \sum_0^{\infty} \binom{m}{k} x^k$$

$$\binom{m}{k} = \frac{m(m-1)\cdots(m-k+1)}{k!}$$

$$(1 + x)^m = 1 + mx + \frac{m(m-1)}{2!}x^2 + \frac{m(m-1)(m-2)}{3!}x^3 + \dots$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

بسط مکلورن (Maclaurin Expansion)
بسط تیلور حول نقطه صفر ($x_0 = 0$) را بسط مکلورن می‌نامند.

$$f(x) = f(0) + \frac{f^{(1)}(0)}{1!}x + \frac{f^{(2)}(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k + \dots$$

سریهای دو جمله‌ای (Binomial Series)

$$(1+x)^m = 1 + mx + \frac{m(m-1)}{2!}x^2 + \frac{m(m-1)(m-2)}{3!}x^3 + \dots$$

مثال:

$$(1+x)^{\frac{1}{2}} = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \frac{1}{16}x^3 + \dots, \quad -1 < x < 1$$

$$(1+x)^{-\frac{1}{2}} = 1 - \frac{1}{2}x + \frac{3}{8}x^2 - \frac{5}{16}x^3 + \dots, \quad -1 < x < 1$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

بسط مکلاورن (Maclaurin Expansion)
بسط تیلور حول نقطه صفر ($x_0 = 0$) را بسط مکلاورن می‌نامند.

$$f(x) = f(0) + \frac{f^{(1)}(0)}{1!}x + \frac{f^{(2)}(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k + \dots$$

سریهای دو جمله‌ای (Binomial Series)

$$(1+x)^m = 1 + mx + \frac{m(m-1)}{2!}x^2 + \frac{m(m-1)(m-2)}{3!}x^3 + \dots$$

مثال:

$$(1+x)^{\frac{3}{2}} = 1 + \frac{3}{2}x + \frac{3}{8}x^2 - \frac{1}{16}x^3 + \dots, \quad -1 < x < 1$$

$$(1+x)^{-\frac{3}{2}} = 1 - \frac{3}{2}x + \frac{15}{8}x^2 - \frac{35}{16}x^3 + \dots, \quad -1 < x < 1$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

بسط مکلورن (Maclaurin Expansion)
بسط تیلور حول نقطه صفر ($x_0 = 0$) را بسط مکلورن می‌نامند.

$$f(x) = f(0) + \frac{f^{(1)}(0)}{1!}x + \frac{f^{(2)}(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k + \dots$$

سریهای دوجمله‌ای (Binomial Series)

$$(1-x)^m = 1 - mx + \frac{m(m-1)}{2!}x^2 - \frac{m(m-1)(m-2)}{3!}x^3 + \dots$$

مثال:

$$(1-x)^{\frac{1}{2}} = 1 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 - \frac{1}{16}x^3 + \dots, \quad 0 < x < 1$$

$$(1-x)^{-\frac{1}{2}} = 1 + \frac{1}{2}x + \frac{3}{8}x^2 + \frac{5}{16}x^3 + \dots, \quad 0 < x < 1$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

بسط مکلورن (Maclaurin Expansion)

بسط تیلور حول نقطه صفر ($x_0 = 0$) را بسط مکلورن می‌نامند.

$$f(x) = f(0) + \frac{f^{(1)}(0)}{1!}x + \frac{f^{(2)}(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k + \dots$$

سریهای هندسی (Geometric Series)

$$f(x) = \frac{1}{1-x}, \quad |x| < 1$$

$$f^{(1)}(x) = \frac{1}{(1-x)^2}, \quad f^{(1)}(0) = 1$$

$$f^{(2)}(x) = \frac{1 \times 2}{(1-x)^3}, \quad f^{(2)}(0) = 2!$$

$$f^{(3)}(x) = \frac{1 \times 2 \times 3}{(1-x)^4} = \frac{3!}{(1-x)^4}, \quad f^{(3)}(0) = 3!$$

⋮

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

بسط مکلاورن (Maclaurin Expansion)
بسط تیلور حول نقطه صفر ($x_0 = 0$) را بسط مکلاورن می‌نامند.

$$f(x) = f(0) + \frac{f^{(1)}(0)}{1!}x + \frac{f^{(2)}(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k + \dots$$

سریهای هندسی (Geometric Series)

⋮

$$f^{(k)}(x) = \frac{k!}{(1-x)^{k+1}}, \quad f^{(k)}(0) = k!$$

⋮

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^k + \dots \Rightarrow \frac{1}{1-x} = \sum_{k=0}^{\infty} x^k = 1 + x + x^2 + \dots$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

بسط مکلاورن (Maclaurin Expansion)
بسط تیلور حول نقطه صفر ($x_0 = 0$) را بسط مکلاورن می‌نامند.

$$f(x) = f(0) + \frac{f^{(1)}(0)}{1!}x + \frac{f^{(2)}(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k + \dots$$

سریهای هندسی (Geometric Series)

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{k=0}^{\infty} x^k, \quad |x| < 1$$

$$x \rightarrow -x : \frac{1}{1+x} = \sum_{k=0}^{\infty} (-x)^k = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^k$$

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^k = 1 - x + x^2 + \dots, \quad |x| < 1$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

بسط مکلاورن (Maclaurin Expansion)
بسط تیلور حول نقطه صفر ($x_0 = 0$) را بسط مکلاورن می‌نامند.

$$f(x) = f(0) + \frac{f^{(1)}(0)}{1!}x + \frac{f^{(2)}(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k + \dots$$

سریهای هندسی (Geometric Series)

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{k=0}^{\infty} x^k, \quad \frac{1}{1+x} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^k, \quad |x| < 1$$

$$f(x) = \frac{1}{1-x^2}, \quad |x| < 1$$

$$\frac{1}{1-x^2} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1-x} + \frac{1}{1+x} \right) = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{\infty} [(-1)^k + 1] x^k$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

بسط مکلورن (Maclaurin Expansion)
بسط تیلور حول نقطه صفر ($x_0 = 0$) را بسط مکلورن می‌نامند.

$$f(x) = f(0) + \frac{f^{(1)}(0)}{1!}x + \frac{f^{(2)}(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k + \dots$$

سریهای هندسی (Geometric Series)

$$\frac{1}{1-x^2} = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{\infty} [(-1)^k + 1]x^k$$

$$k = \text{فرد} : 1 + (-1)^k = 0, \quad k = \text{زوج} : 1 + (-1)^k = 2 \Rightarrow k \rightarrow 2k$$

$$\frac{1}{1-x^2} = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{\infty} [(-1)^k + 1]x^k = \sum_{k=0}^{\infty} x^{2k}$$

$$\frac{1}{1-x^2} = \sum_{k=0}^{\infty} x^{2k} = 1 + x^2 + x^4 + \dots, \quad |x| < 1$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

بسط مکلورن (Maclaurin Expansion)
بسط تیلور حول نقطه صفر ($x_0 = 0$) را بسط مکلورن می‌نامند.

$$f(x) = f(0) + \frac{f^{(1)}(0)}{1!}x + \frac{f^{(2)}(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k + \dots$$

سریهای هندسی (Geometric Series)

$$f(x) = \frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{k=1}^{\infty} kx^k, \quad |x| < 1$$

از طرفین سری هندسی نسبت به x مشتق می‌گیریم

$$\frac{d}{dx} \frac{1}{1-x} = \frac{d}{dx} \sum_{k=0}^{\infty} x^k \Rightarrow \frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{k=0}^{\infty} kx^{k-1}$$

$$\frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{k=1}^{\infty} kx^{k-1} = 1 + 2x + 3x^2 + \dots, \quad |x| < 1$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

بسط مکولرن (Maclaurin Expansion)
بسط تیلور حول نقطه صفر ($x_0 = 0$) را بسط مکولرن می‌نامند.

$$f(x) = f(0) + \frac{f^{(1)}(0)}{1!}x + \frac{f^{(2)}(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k + \dots$$

سریهای هندسی (Geometric Series)

$$f(x) = \frac{1}{(1+x)^2} = \sum_{k=1}^{\infty} kx^k, \quad |x| < 1$$

از طرفین سری هندسی نسبت به x مشتق می‌گیریم

$$\frac{d}{dx} \frac{1}{1+x} = \frac{d}{dx} \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^k \Rightarrow -\frac{1}{(1+x)^2} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k kx^{k-1}$$

$$\frac{1}{(1+x)^2} = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} kx^{k-1} = 1 - 2x + 3x^2 + \dots, \quad |x| < 1$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

بسط مکولرن (Maclaurin Expansion)
بسط تیلور حول نقطه صفر ($x_0 = 0$) را بسط مکولرن می‌نامند.

$$f(x) = f(0) + \frac{f^{(1)}(0)}{1!}x + \frac{f^{(2)}(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k + \dots$$

سریهای هندسی (Geometric Series)

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{k=0}^{\infty} x^k, \quad |x| < 1$$

$$f(x) = \ln(1-x), \quad |x| < 1$$

$$\ln(1-x) = - \int \frac{dx}{1-x} = - \int \sum_{k=0}^{\infty} x^k dx = - \sum_{k=0}^{\infty} \int x^k dx = - \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{k+1}}{k+1}$$

$$\ln(1-x) = - \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{k+1}}{k+1} = -x - \frac{1}{2}x^2 + \dots, \quad |x| < 1$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

بسط مکلاورن (Maclaurin Expansion)
بسط تیلور حول نقطه صفر ($x_0 = 0$) را بسط مکلاورن می‌نامند.

$$f(x) = f(0) + \frac{f^{(1)}(0)}{1!}x + \frac{f^{(2)}(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k + \dots$$

سریهای هندسی (Geometric Series)

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^k, \quad |x| < 1$$

$$f(x) = \ln(1+x), \quad |x| < 1$$

$$\ln(1+x) = \int \frac{dx}{1+x} = \int \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^k dx = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \int x^k dx = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k+1} x^{k+1}$$

$$\ln(1+x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k+1} x^{k+1} = x - \frac{1}{2}x^2 + \dots, \quad |x| < 1$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

بسط مکلاورن (Maclaurin Expansion)
بسط تیلور حول نقطه صفر ($x_0 = 0$) را بسط مکلاورن می‌نامند.

$$f(x) = f(0) + \frac{f^{(1)}(0)}{1!}x + \frac{f^{(2)}(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k + \dots$$

سریهای هندسی (Geometric Series)

$$\ln(1-x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k+1}x^{k+1}, \quad \ln(1+x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k+1}x^{k+1}$$

$$\frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right) = \frac{1}{2} (\ln(1+x) - \ln(1-x)) = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{[(-1)^k + 1]}{k+1} x^{k+1}$$

$$k = \text{فرد} : 1 + (-1)^k = 0, \quad k = \text{زوج} : 1 + (-1)^k = 2 \Rightarrow k \rightarrow 2k$$

$$\frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2k+1} x^{2k+1} = x + \frac{1}{3}x^3 + \dots, \quad |x| < 1$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

بسط مکلاورن (Maclaurin Expansion)
بسط تیلور حول نقطه صفر ($x_0 = 0$) را بسط مکلاورن می‌نامند.

$$f(x) = f(0) + \frac{f^{(1)}(0)}{1!}x + \frac{f^{(2)}(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k + \dots$$

تابع نمایی

$$f(x) = e^{\alpha x}, \quad -\infty < x < \infty$$

$$f^{(1)}(x) = \alpha e^{\alpha x}$$

$$f^{(2)}(x) = \alpha^2 e^{\alpha x}$$

\vdots

$$f^{(k)}(x) = \alpha^k e^{\alpha x}$$

\vdots

$$e^{\alpha x} = 1 + \alpha x + \frac{1}{2!}\alpha^2 x^2 + \dots + \frac{1}{k!}\alpha^k x^k + \dots \Rightarrow$$

$$e^{\alpha x} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \alpha^k x^k$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

بسط مکلاورن (Maclaurin Expansion)
بسط تیلور حول نقطه صفر ($x_0 = 0$) را بسط مکلاورن می‌نامند.

$$f(x) = f(0) + \frac{f^{(1)}(0)}{1!}x + \frac{f^{(2)}(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k + \dots$$

تابع نمایی

$$e^{\alpha x} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \alpha^k x^k = 1 + \alpha x + \frac{1}{2} \alpha^2 x^2 + \dots$$

$$x \rightarrow -x : e^{-\alpha x} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \alpha^k (-x)^k$$

$$e^{-\alpha x} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k!} \alpha^k x^k = 1 - \alpha x + \frac{1}{2} \alpha^2 x^2 + \dots$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

بسط مکلورن (Maclaurin Expansion)
بسط تیلور حول نقطه صفر ($x_0 = 0$) را بسط مکلورن می‌نامند.

$$f(x) = f(0) + \frac{f^{(1)}(0)}{1!}x + \frac{f^{(2)}(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k + \dots$$

توابع هیپربولیکی

$$e^{\alpha x} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \alpha^k x^k, \quad e^{-\alpha x} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k!} \alpha^k x^k$$

$$\cosh \alpha x = \frac{1}{2}(e^{\alpha x} + e^{-\alpha x}) = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{[1 + (-1)^k]}{k!} \alpha^k x^k$$

$$k = \text{فرد} : 1 + (-1)^k = 0, \quad k = \text{زوج} : 1 + (-1)^k = 2 \Rightarrow k \rightarrow 2k$$

$$\cosh \alpha x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\alpha^{2k}}{(2k)!} x^{2k} = 1 + \frac{1}{2} \alpha^2 x^2 + \dots$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

بسط مکلاورن (Maclaurin Expansion)
بسط تیلور حول نقطه صفر ($x_0 = 0$) را بسط مکلاورن می‌نامند.

$$f(x) = f(0) + \frac{f^{(1)}(0)}{1!}x + \frac{f^{(2)}(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k + \dots$$

توابع هیپربولیکی

$$e^{\alpha x} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \alpha^k x^k, \quad e^{-\alpha x} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k!} \alpha^k x^k$$

$$\sinh \alpha x = \frac{1}{2}(e^{\alpha x} - e^{-\alpha x}) = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{[1 - (-1)^k]}{k!} \alpha^k x^k$$

$$k = \text{فرد} : 1 - (-1)^k = 2, \quad k = \text{زوج} : 1 - (-1)^k = 0 \Rightarrow k \rightarrow 2k + 1$$

$$\sinh \alpha x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\alpha^{2k+1}}{(2k+1)!} x^{2k+1} = x + \frac{1}{6} \alpha^3 x^3 + \dots$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

بسط مکلاورن (Maclaurin Expansion)
بسط تیلور حول نقطه صفر ($x_0 = 0$) را بسط مکلاورن می‌نامند.

$$f(x) = f(0) + \frac{f^{(1)}(0)}{1!}x + \frac{f^{(2)}(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k + \dots$$

توابع مثلثاتی

$$f(x) = \tanh \alpha x$$

$$f^{(1)}(x) = \alpha(1 - \tanh^2 \alpha x), \quad f^{(1)}(0) = \alpha$$

$$f^{(2)}(x) = 2\alpha^2 \tanh \alpha x(1 - \tanh^2 \alpha x), \quad f^{(2)}(0) = 0$$

$$f^{(3)}(x) = 2\alpha^3(1 - \tanh^2 \alpha x)(-1 + 3 \tanh^2 \alpha x), \quad f^{(3)}(0) = -2\alpha^3$$

⋮

$$\tanh \alpha x = \alpha x - \frac{1}{3}\alpha^3 x^3 + \dots$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

بسط مکلاورن (Maclaurin Expansion)
بسط تیلور حول نقطه صفر ($x_0 = 0$) را بسط مکلاورن می‌نامند.

$$f(x) = f(0) + \frac{f^{(1)}(0)}{1!}x + \frac{f^{(2)}(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k + \dots$$

توابع مثلثاتی

$$e^{\alpha x} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \alpha^k x^k$$

$$x \rightarrow ix : e^{i\alpha x} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{i^k}{k!} \alpha^k x^k$$

$$x \rightarrow -ix : e^{-i\alpha x} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k i^k}{k!} \alpha^k x^k$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

بسط مکلاورن (Maclaurin Expansion)
بسط تیلور حول نقطه صفر ($x_0 = 0$) را بسط مکلاورن می‌نامند.

$$f(x) = f(0) + \frac{f^{(1)}(0)}{1!}x + \frac{f^{(2)}(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k + \dots$$

توابع مثلثاتی

$$e^{i\alpha x} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{i^k}{k!} \alpha^k x^k, \quad e^{-i\alpha x} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k i^k}{k!} \alpha^k x^k$$

$$\cos \alpha x = \frac{1}{2}(e^{i\alpha x} + e^{-i\alpha x}) = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{i^k [1 + (-1)^k]}{k!} \alpha^k x^k$$

$$k = \text{فرد} : 1 + (-1)^k = 0, \quad k = \text{زوج} : 1 + (-1)^k = 2 \Rightarrow k \rightarrow 2k$$

$$\cos \alpha x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{i^{2k} \alpha^{2k}}{(2k)!} x^{2k}$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

بسط مکلورن (Maclaurin Expansion)
بسط تیلور حول نقطه صفر ($x_0 = 0$) را بسط مکلورن می‌نامند.

$$f(x) = f(0) + \frac{f^{(1)}(0)}{1!}x + \frac{f^{(2)}(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k + \dots$$

توابع مثلثاتی

$$\cos \alpha x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{i^{2k} \alpha^{2k}}{(2k)!} x^{2k}, \quad i^{2k} = (-1)^k$$

$$\cos \alpha x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \alpha^{2k}}{(2k)!} x^{2k} = 1 - \frac{1}{2} \alpha^2 x^2 + \dots$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

بسط مکلورن (Maclaurin Expansion)
بسط تیلور حول نقطه صفر ($x_0 = 0$) را بسط مکلورن می‌نامند.

$$f(x) = f(0) + \frac{f^{(1)}(0)}{1!}x + \frac{f^{(2)}(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k + \dots$$

توابع مثلثاتی

$$e^{i\alpha x} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{i^k}{k!} \alpha^k x^k, \quad e^{-i\alpha x} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k i^k}{k!} \alpha^k x^k$$

$$\sin \alpha x = \frac{1}{2i}(e^{i\alpha x} - e^{-i\alpha x}) = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{i^k [1 + (-1)^k]}{k!} \alpha^k x^k$$

$$k = \text{فرد} : 1 - (-1)^k = 2, \quad k = \text{زوج} : 1 - (-1)^k = 0 \Rightarrow k \rightarrow 2k + 1$$

$$\sin \alpha x = \frac{1}{i} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{i^{2k+1} \alpha^{2k+1}}{(2k+1)!} x^{2k+1}$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

بسط مکلورن (Maclaurin Expansion)
بسط تیلور حول نقطه صفر ($x_0 = 0$) را بسط مکلورن می‌نامند.

$$f(x) = f(0) + \frac{f^{(1)}(0)}{1!}x + \frac{f^{(2)}(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k + \dots$$

توابع مثلثاتی

$$\sin \alpha x = \frac{1}{i} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{i^{2k+1} \alpha^{2k+1}}{(2k+1)!} x^{2k+1}, \quad i^{2k+1} = i(-1)^k$$

$$\sin \alpha x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \alpha^{2k+1}}{(2k+1)!} x^{2k+1} = x - \frac{1}{6} \alpha^3 x^3 + \dots$$

مفاهیم اولیه و متداول ریاضی در فیزیک

بسط مکلاورن (Maclaurin Expansion)
بسط تیلور حول نقطه صفر ($x_0 = 0$) را بسط مکلاورن می‌نامند.

$$f(x) = f(0) + \frac{f^{(1)}(0)}{1!}x + \frac{f^{(2)}(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k + \dots$$

توابع مثلثاتی

$$f(x) = \tan \alpha x, \quad |x| < \pi/2\alpha$$

$$f^{(1)}(x) = \alpha(1 + \tan^2 \alpha x), \quad f^{(1)}(0) = \alpha$$

$$f^{(2)}(x) = 2\alpha^2 \tan \alpha x(1 + \tan^2 \alpha x), \quad f^{(2)}(0) = 0$$

$$f^{(3)}(x) = 2\alpha^3(1 + \tan^2 \alpha x)(1 + 3 \tan^2 \alpha x), \quad f^{(3)}(0) = 2\alpha^3$$

⋮

$$\tan \alpha x = \alpha x + \frac{1}{3}\alpha^3 x^3 + \dots$$